



分布图 58 白头鸚鵡 *Gamporhynchus rufulus*

1. *G. r. rufulus* ○ 2. *G. r. torquatus* ●

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(9)	35—41	204—225	15—17	88—96	106—115	27—32
♀♀(8)	43—50	213—241	16.7—18	88—98	112—121	28—31

亚种分化 本属只有 1 种,分 3 个亚种,分布于我国的有 2 个亚种。

#### 亚 种 检 索

前额到颈,部分白色;上体棕色;上胸有一黑环,胸部浅棕红色;下体仅喉部和腹部中央白色 ..... 云南亚种 *G. r. torquatus*  
 前额到颈,全部白色;上体灰橄榄褐色;下体全白 ..... 指名亚种 *G. r. rufulus*

#### (1) 指名亚种 *Gamporhynchus rufulus rufulus* Blyth

国内仅见于云南西部;在国外,分布于锡金,不丹,印度,孟加拉国,缅甸等。

头顶、头侧、颈部、喉部、胸部及腹部纯白;上体、翅及尾等均为灰橄榄褐色,不沾棕色;下体以白色为主,腹部两侧及尾下覆羽均着皮黄色。两性相同。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	40	231	14	93	113	33
♀♀(4)	40—49	217—240	15—17	93—95	110—113	29—31