

分布于西藏南部聂拉木一带；在国外，见于锡金和不丹。

形态及量衡度见前。

*Trochalopterus nigrimentum* Oates, 1889, in Hume, Nest and Eggs Indian Bds., ed. 2, 1: 57 (模式产地: Sikkim, ex Kinnear, 1937).

### (2) 昌都亚种 *Garrulax erythrocephalus imprudens* Ripley

分布于西藏昌都地区错那、通麦(野贡河)等地。

与 *G. e. nigrimentum* 近似，但上下体均较暗些；头顶前黑后红，黑褐色部分具有暗灰褐色羽缘；耳羽黑色而具白缘。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂(1)	80	约 238	23	93	116	37
♀♀(2)	73—74	236—245	19—20.5	91—94	110—113	35—39

*Garrulax erythrocephalus imprudens* Ripley, 1948, Proc. Biol. Soc. Wash. 61: 102 (模式产地: 印度阿萨姆邦)。

### (3) 滇西亚种 *Garrulax erythrocephalus woodi* (Stuart Baker)

分布于云南西部腾冲、西北部贡山(任国荣在四川康定报道的红头噪鹛，可能属于本亚种)；在国外，见于缅甸东北部。

头顶前黑后红，黑褐部分的羽缘沾葡萄褐色而非灰色；耳羽呈葡萄褐与暗灰纵纹相杂状；初级覆羽内羽暗褐，外羽绿黄；胸部黑斑略呈圆状，较上列二亚种发达。

量衡度(据中国科学院昆明动物研究所, 1980):

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(11)	99.1	约 266.8	22.1	103.7	126	37.8
	(80—135)	(255—285)	(21—24)	(100—108)	(115—132)	(34—40)
♀♀(6)	65—90	254—270	22—23	96—106	120—130	35—39

*Trichalopterus (sic) erythrolaema (sic) woodi* Baker, 1914, Bull. Brit. Orn. Cl. 35: 17 (模式产地: 缅甸北部)。

*Lanthocincla forresti* Rothschild, 1921, Nov. Zool. 28: 35 (模式产地: 云南西部怒江和龙川江间的山脉)。

### (4) 滇南亚种 *Garrulax erythrocephalus melanostigma* Blyth

分布于云南西南部西盟一带；在国外，见于缅甸及泰国。

头顶全栗红色；胸无黑斑，下体余部橄榄灰褐，中央部分沾黄；上体亦橄榄灰褐，但较暗；初级覆羽黑褐；耳羽与 *G. e. woodi* 近似。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	76—77	约 230—234	22	92—100	111—120	39
♀♀(2)	70—73	234—260	22.5—25	94—100	110—127	36—37

*Garrulax melanostigma* Blyth, 1855, Journ. Aso. Soc. Bengal 24: 268 (模式产地: 缅甸 Mulayit Taung)。

### (5) 绿春亚种 *Garrulax erythrocephalus connectens* (Delacour)

分布于云南绿春黄连山一带；在国外，见于老挝和越南等国的北部。

本亚种与 *G. e. melanostigma* 近似，但背部橄榄绿，不同后者之为暗褐；胸部较多棕

褐色；初级覆羽暗褐，不似后者之为黑色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(4)	67—77	234—242	17.4—20	89—97	100—112	38—43
♀♀(3)	71—75	223—251	20—21	87—95	97—107	37—45

*Trochalopterus erythrocephalus connectans* (sic) Delacour, 1929, Bull. Brit. Orn. Cl. 49: 58 (模式产地: Phu Ke, near Chiang Khwang, Laos).

生态 平时常结小群栖于栎树林中灌丛、竹丛间。性怯，稍有动静，就隐匿密丛深处。叫声低沉而连续。有时与黑顶噪鹛或白喉噪鹛等混群活动，在灌丛间来往窜跳，不时落地面残叶或岩上苔藓间觅食，很少见在树木高处。胃内剖有昆虫、浆果及种子等。

*Cinclosoma erythrocephalus* Vigors, 1832, Proc. Comm. Zool. Soc. London (1931): 171 (Himalayas).

*Trochalopterus erythrocephalus*, Baker, 1922, 162—168.


*Garrulax erythrocephalus*, Vaurie, 1959, 434—436; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 375—378;

Ali et Ripley, 1972, 57—62; 郑作新, 1976, 651—652。

### 61. 丽色噪鹛 *Garrulax formosus* (Verreaux) (图版四: 9)

英名: Exquisite Laughing Thrush

地理分布 四川中部灌县、宝兴、康定、及西南部，云南东北部盐津，及？广西 (Berlioz); 在国外，仅录得自越南北部。



分布图 47 丽色噪鹛 *Garrulax f. formosus*