



分布图 24 小黑领噪鹛 *Garrulax monileger*

1. *G. m. monileger* ○ 2. *G. m. schauenseei* ● 3. *G. m. melli* ⊙ 4. *G. m. schmackeri* ⊙

(1) 指名亚种 *Garrulax monileger monileger* (Hodgson)

采自云南的极西部宗勒、潞西、盈江一带,海拔 850—1,250 米;在国外,自尼泊尔至印度的阿萨姆及缅甸等,均有分布。

形态及量衡度均列于前文。

*Cinlosoma monilegera* Hodgson, 1836, As. Res. 19:147 (模式产地: 尼泊尔)。

(2) 滇南亚种 *Garrulax monileger schauenseei* Delacour et Greenway

分布于云南南部思茅(常麟定, 1938)和西双版纳傣族自治州的景东、勐养、勐阿、井伞、勐腊、勐海、临沧、新平等处;在国外,见于老挝、泰国及缅甸。

上体较指名亚种稍棕些;耳羽的上下黑纹较阔;胸部黑圈也较发达,向上直伸至耳羽后面;两胁的棕色较多较浓;外侧尾羽端部棕色,不似指名亚种之为纯白。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(4)	85—90	260—270	26—28	115—123	122—137	37—40
♀♀(4)	80—92	271—299	27—28	112—121	128—131	36—44

*Garrulax monileger schauenseei* Delacour et Greenway, 1939, Bull. Brit. Orn. Cl. 59: 133 (模式产地: 老挝 Xieng Khouang)。

(3) 华南亚种 *Garrulax monileger melli* Stresemann