

山脉西部及锡金。

(1) 藏南亚种 *Garrulax striatus cranbrooki* (Kinnear)

采自西藏南部墨脱、波密、背崩等地，云南西北部贡山西部，在国外，分布于不丹，印度阿萨姆及缅甸。

形态详见上文。

量衡度见前。

Grammatoptila striata cranbrooki Kinnear, 1932, Bull. Brit. Orn. Cl. 53:79(模式产地: 缅甸 Adung 山谷)。

Garrulax striatus brahmaputra Hachisuka, 1953, Auk 70:92; *nom. nov.* for:

Grammatophila austeni Oates, 1889, Faun. Brit. Ind., Bds. 1:104 (模式产地: 印度阿萨姆邦); *ncc* 01 Godwin-Austen, 1870.

(2) 珠峰亚种 *Garrulax striatus vibex* Ripley

采自西藏南部樟木; 在国外, 见于尼泊尔。眼后无宽阔的黑纹, 上体自额至尾上覆羽, 均栗褐色, 头顶最深浓, 各羽均贯以白色羽干纹。

本亚种与 *G. s. sikkimensis* 体形大小相似, 但后者羽色较暗浓, 背部较多红褐色, 白纹却较狭细(据 Vaurie, 1959)。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(2)	135,140	约 290	25,26	137	128,138	43,44
♀♀(2)	140,142	约 280	24,25	133,135	130,134	41,42

Garrulax striatus vibex Ripley, 1950, Proc. Biol. Soc. Wash. 63:103 (模式产地: 尼泊尔的 Godavari)。

生态 栖于 2,000 米左右的矮树和灌丛间, 较其他噪鹛更好树栖。成对或结小群活动, 叫声嘈杂, 如同别种噪鹛。嗜吃昆虫、果实和种子等。

Garrulax striatus Vigors, 1831, Proc. Comm. Zool. Soc. London 1:7 (模式产地: 喜马拉雅山脉地区)。

Grammatoptila striata, Baker, 1922, 184—185.

Garrulax striatus, Smythies, 1953, 56; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 356—357; Ali et Ripley, 1972, 10—14; 郑作新, 1976, 631。

36. 栗喉噪鹛 *Garrulax strepitans* Blyth

英名: Tickell's Laughing Thrush

地理分布 仅于 1966 年 IV 9 日, 得自云南西南部澜沧(黑山); 在国外, 见于老挝, 泰国及缅甸等。

鉴别特征 头顶和后颈红褐; 脸黑; 上体大都橄榄褐; 喉呈朱克力褐色, 向后转为石板灰色。

形态 上体橄榄褐; 初级覆羽和飞羽均近黑色, 羽缘橄榄褐; 鼻羽、额基、颞、喉侧、眼先、眼周、脸及耳羽前部均黑; 耳羽后部转栗, 再后具一白斑; 上背、颈侧及胸部的灰羽连成一灰圈; 喉和前颈黑朱克力色; 腹灰白; 体侧、胫羽及尾下覆羽等均橄榄褐色。(摘自

Sharpe, 1883)¹⁾。嘴黑;眼红(据 Smythies, 1953)。

量衡度(据彭燕章等, 1973)²⁾:

性 别	体 重	翅
♀♀(2)	117,124	133,134

亚种分化 本种有两个亚种: *Garrulax s. strepitans*, 和 *G. s. ferrarius* Riley。前者分布于老挝、缅甸、泰国西部及我国云南的西南部;后者仅限于泰国东南部。

生态 习性似白冠噪鹛,但较胆怯,往往十多只结成小群在乔木的巨枝上奔驰,而不像白冠噪鹛之在地面上。叫声洪亮清晰而音调高,三声一度,而后继以音调低而长的三个叫声。剖胃只见有甲虫和蚂蚁(据 Smythies, 1953)。

Garrulax strepitans Blyth ex Tickell, 1855, Journ. As. Soc. Bengal 24:263 (模式产地: 缅甸 Tenasserim); Baker, 1922, 154—155; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 357; Smythies, 1953, 53—54 郑作新, 1976, 631。

37. 褐胸噪鹛 *Garrulax maesi* (Oustalet)

英名: Maes's Laughing Thrush

地理分布 我国西南部,包括四川、云南、西藏、贵州、广西以及海南岛;在国外,仅见于越南北部及老挝。

鉴别特征 体形大小与黑喉噪鹛近似。上下体几纯灰褐;眼先、眼周及颞等均黑;胸褐;耳羽灰白或棕红色。

形态(依自四川峨眉山于 1956 年 7 月 11 日所采的标本)雄鸟: 头顶和后颈淡灰褐,背面转为褐灰色,两翅和尾的褐色更深;额基、眼先、眼周、脸及颞等均黑;耳羽灰白,其上有条白纹,向后转至耳羽后缘;白纹与耳羽之间还有一短黑色细纹位于眼后,喉和胸淡褐;下体余部与背相同。

雌雄同色。

虹膜红褐;嘴黑;脚黑褐;爪黄褐。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(2)	112.5—113	280—300	22	130—137	125—138	45
♀(1)	107	281	23.5	132	127	44

亚种分化 本种计有 4 个亚种,其中除 *Garrulax maesi varennei* (Delacour) 分布于老挝外,其余各亚种均见于国内。

1) Sharpe, R. B. 1883 Catalogue of Passeriformes in the British Museum. Cichlomorphae: Pt. IV. Timeliidae: 457.

2) 彭燕章等, 1973. 云南鸟类的国内新纪录. 动物学报 19(3): 307.