

V. 鹪鹩属 *Napothera* G. R. Gray, 1842

形态 体形似鹪鹩；脚较强；翅较短；尾羽具尖形羽端，较翅还短，一般不及 50 毫米；嘴直而细，有嘴须；鼻孔外露。体羽软而松弛，上体具鳞状斑。

地理分布 从印度阿萨姆、中印半岛，东抵我国的海南岛，向北见于我国南部广西、云南等省区，向南至印度尼西亚的苏门答腊岛及爪哇岛。

Napothera G. R. Gray, 1842, App. List Gen. Bds.: 8. 模式种: *Myiothera epilepidotus* Temminck.
Turdinus Blyth, 1844, Journ. As. Soc. Bengal 13: 382. 模式种: *Malacopteron macr. dactylum* Strickland.

Turdinulus Hume, 1878, in Hume and Davison, Stray Feath. 6: 234, 235. 模式种: *Pnoepyga roberti* Godwin-Austen and Walden.

参阅: Voous, 1949, Limosa 22: 347—352; *Turdinus* 属的评述: Baker, 1922, 149—155; Smythies, 1953, 30—31; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 286—293; Ali et Ripley, 1971, 152—155; 郑作新, 1976, 609—610; 昆明动物研究所, 1980, 172—173; de Schauensee, 1984, 368—369.

鹪鹩属 *Napothera* 分种检索

1. 尾长不及 88 毫米，但超过 45 毫米 灰岩鹪鹩 *N. crispifrons* (34)
尾长不及 45 毫米 2
2. 尾长超过翅长之一半 短尾鹪鹩 *N. brevicaudata* (35)
尾长不及翅长之一半 纹胸鹪鹩 *N. epilepidota* (36)

10. 灰岩鹪鹩 *Napothera crispifrons* (Blyth)

英名: Limestone Wren Babbler

地理分布 十分罕见，曾录自云南；在国外，见于缅甸南部，泰国，老挝及越南。

鉴别特征 体形大小约 180—190 毫米。上体大都灰橄榄褐色，具鳞状斑。

形态 (据云南标本) 自额至背橄榄褐色，各羽均具黑缘；腰、尾上覆羽、尾羽及两翅表面亦橄榄褐；额的两侧及一短眉纹为灰白色而具黑点；喉及上胸均白，杂以暗褐色纵纹，特别是在胸部；下体余部为带赭的橄榄褐色。

虹膜红褐；上嘴深角褐，下嘴灰铅；脚和趾灰褐。

量衡度:

| 性别 | 体 重 | 全 长 | 嘴 峰 | 翅 | 尾 | 跗 蹠 |
|-------|-------|---------|-------|-------|----|---------|
| ♂♂(2) | 36—40 | 174—183 | 18—20 | 73—76 | 73 | 30.3—32 |
| ♀(1) | 37 | 185 | 20.1 | 74 | 72 | 30.5 |

亚种分化 本种有 3 个亚种，其中见于我国境内者仅有下列的 1 个，即云南亚种。云南迄今未见有白色变型。

(1) 云南亚种 *Napothera crispifrons annamensis* Delacour et Jabouille

分布于云南南部易武、勐仑；在国外，见于老挝北部及越南。

形态和量衡度详见前文。

Corythocichla annamensis Delacour et Jabouille, 1928, Bull. Brit. Orn. Cl. 48: 131 (模式产地 越南南部 Phuqui)。

生态 常单独或结小群活动于石灰岩地带，行动轻快活泼，犹如小形的鸫。不时栖息于岩石尖顶处，两翅低下，尾巴上翘，蓬蓬勃勃地倾吐吱吱的鸣啾声，喋喋不休，相当单调。食物主要为昆虫及陆栖螺类，兼吃植物种子。性不羞怯，易于观察(据 Baker,引自 Davison)。

Turdinus crispifrons Blyth, 1853, Journ. As. Soc. Bengal 24: 269 (模式产地: 缅甸 Tenasserim)。




图5 灰岩鹪鹩 *Napothera crispifrons*

11. 短尾鹪鹩 *Napothera brevicaudata*

(Blyth) (图版二: 3)

英名: Short-tailed Wren Babbler

地理分布 主要在中南半岛，西至印度的阿萨姆，南抵马来半岛，北达我国云南、广西等。

鉴别特征 体形较灰岩鹪鹩稍小。上体具鳞片状斑；喉具暗褐色纵纹。

形态 (据云南西盟标本) 上体灰橄榄褐色，各羽除腰羽及尾上覆羽以外，均缘以黑边，因而呈鳞片状；尾短而呈暗红褐色；两翅亦橄榄褐，大覆羽及最内侧一枚飞羽均具微小白端；眼先、短眉纹、颊及耳羽等均深灰，耳羽带棕；颈、喉等灰白，杂以暗褐色纵纹；胸和腹暗棕色，两胁、围肛羽及尾下覆羽等转为暗褐。雌雄同色。

虹膜暗红；上嘴呈暗角褐色，下嘴稍淡而带灰；脚及趾等均灰褐色。

量衡度：

| 性别 | 体重 | 全长 | 嘴峰 | 翅 | 尾 | 跗蹠 |
|------|----|-----|------|----|----|------|
| ♂(1) | 27 | 146 | 16.8 | 66 | 55 | 24.5 |

亚种分化 本种约有 8 个亚种的分化，其中见于国内者，只有 2 个亚种。

亚 种 检 索

体形较大；上体褐色较暗浓；大覆羽和飞羽等的末端均具显著白点；下体呈焦茶褐色，腹部羽缘淡白 广西亚种 *N. b. stevensi*