



分布图 90 白眶鸦雀 *Paradoxornis conspicillatus*

1. *P. c. conspicillatus* ○ 2. *P. c. rocki* ●

体色较淡;嘴形较粗,嘴峰较曲 湖北亚种 *P. c. rocki*

(1) 指名亚种 *Paradoxornis c. conspicillatus* (David)

分布于青海东北部祁连山,甘肃西部、西南部及东南部,陕西南部,及四川北部、东北部和中部。

形态和量衡度见前。

[*Suthora*] *conspicillata* David, 1871, Bull. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 7: 9, 14 (模式产地:
青海极东部)。

(2) 湖北亚种 *Paradoxornis conspicillatus rocki* (Bangs et Peters)

分布仅局限于湖北西部宜昌及西南部。

体色全都较指名亚种为淡,头部的褐色亦浅淡;嘴形较粗厚,嘴峰较曲。

量衡度(据原始文献):

性 别	嘴峰长度 (从嘴基量起)	嘴峰高度 (在嘴基处)	翅	尾	跗 跖
♀,♂(2)	10	8—8.5	54—56	65	22

Suthora conspicillatus rocki Bangs et Peters, 1928, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. 68:345 (模式产地: 湖北西部宜昌及西南部“Hsien-tien-tsze”).

生态 栖于比较高(1,900米)的山地竹林及灌丛中,成群活动,有时与棕头鸦雀 (*P.*