

(3) 贡山亚种 *Paradoxornis flavirostris gongshanensis* Cheng, nov. ssp.

产于云南极西部的种群，其外观形态与华南亚种十分近似，但体形较小，嘴形也较小，翅膀显著较短。现将这两种的翅膀长度，比较于表 7。

表 7 华南亚种与贡山亚种翅长比较

华南亚种 <i>P. f. guttaticollis</i>		贡山亚种 <i>P. f. gongshanensis</i>	
四川: 雅安、天全	2♂♂88—89	云南西部	
广西: 瑶山、罗香	3♂♂88—88.3 3♀♀86—90	贡山、丽江、漾濞、 泸水、腾冲、易武	12♂♂82.5(81—86) 5♀♀80.9(80—82.5)
福建: 建阳、南平、邵武、沙县	4♂♂87—88 2♀♀82—88		

据上所述，我们认为云南西部的黄嘴鸦雀种群应认为是一个新亚种，即 *Paradoxornis flavirostris gongshanensis* Cheng, nov. ssp.

正模标本: 1♂, 1960 XI.30, 采自云南漾濞(海拔 1,700 米)。

副模标本: 1♀, 采期与产地同上。

模式标本放置在北京中国科学院动物研究所。

生态 平时结小群活动于灌木丛，矮竹丛，或稀树草坡，夏间大多在山地，冬迁山麓芦苇地带。嘴粗厚而有力，能撕裂草茎、花梗等，觅食隐匿于其中的蛀虫及其他虫类。它们虽好结群，然而彼此之间也常相斗，互咬脚部。在绿丛掩蔽处索吃饵料时，啁鸣不休，非常嘈杂而单调。食物以蚂蚁、甲虫等为主，兼吃杂草种子。巢呈深杯状，以细柔树皮、粗草、竹叶等织成，外敷以蛛网、叶片、纤维等，内铺以更细的草茎、芦苇等，有时还混有毛发(据 Ali et Ripley, 1971)。La Touche (1925—30.p.47) 曾在福建采得一卵，呈白色，光滑而稍有光亮，杂以细稀棕点和紫灰色不规则的短纵纹，卵的量度为 22.5×17 毫米。

*Paradoxornis flavirostris* Gould, 1836, Proc. Zool. Soc. London: 17 (模式产地: 尼泊尔), 郑作新, 1955, 197; 1967, 698; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 433; Ali et Ripley, 1971, 210—213; 中国科学院昆明动物研究所, 1980, 214。

*Paradoxornis guttaticollis*, La Touche, 1925—30, 47—48.

118. 震旦鸦雀 *Paradoxornis heudei* David (图版八: 9)

英名: Chinese Crow-rit

地理分布 几乎限于我国，分布于长江下游及黑龙江省齐齐哈尔市扎龙以至兴凯湖；在国外，仅见于西伯利亚东南部兴凯湖的东部。

鉴别特征 体形似文须雀，但嘴却像鸚鵡，尾亦较文须雀显得长。头顶灰；眉纹黑而长；中央尾羽淡红赭色，外侧尾羽黑而具白端。

形态(据采自南京的标本) 冬羽: 头顶与后颈均灰而沾赭色；眉纹黑，白眼的上方直伸至后颈；上背赭而杂以浅灰色粗纹；两肩及下背和腰等均黄赭色；尾上覆羽及中央一对