

(1) 指名亚种 *Paradoxornis heudei heudei* David

分布于长江下游自江西九江至江苏江阴和浙江杭州。不见于国外。

形态及量衡度见前

Paradoxornis Heudei David, 1872, Compt. rend. Acad. Sci. Paris 74: 1450(模式产地: 江苏南京)。

(2) 黑龙江亚种 *Paradoxornis heudei polivanovi* Stepanyan

分布于黑龙江省齐齐哈尔东郊扎龙渔场, 东抵兴凯湖。

形态(摘自原作者的描述): “头顶较多灰蓝; 上背浅葡萄酒色; 下背及腰均浅赭, 并无明显的暗色纵纹; 耳羽和喉灰白; 腹部赭色也不显著; 尾下覆羽灰白, 稍有赭石色调。初级和次级飞羽的外 翮, 颜色较浅, 为淡白色, 沿羽轴处的赭石色亦较指名亚种为浅。体形较指名亚种为小: ♂♂(3)翅长——61.0; ♀♀(2)翅长——58.1, 59.7 毫米”。

原文未提及眉纹, 但我们从齐齐哈尔采到的幼鸟标本是有眉纹的。翅膀的长度较指名亚种仅稍短些。

Paradoxornis heudei polivanovi Степанян, 1974, Зоол. Жур. 53(8): 1270—1272 (模式产地: 东北兴凯湖)。

生态 这种鸦雀平时栖息于江边的芦苇地, 结群在芦丛间穿梭, 边飞边叫, 群集呼应, 叫声特别喧闹响亮, 往往未见其鸟, 而先听到其颤声。

巢呈杯状, 全由枯干的芦苇而成, 仅有极少的蛛网散铺其内。巢营于芦苇间, 距地面约两米。卵为椭圆形, 壳平滑, 稍有光泽, 底色白而沾绿, 到处杂以暗紫的块斑, 其上散敷以大小不等的赭斑, 其中央处赭色更暗以至焦茶色。 5个卵平均大小为 18.3×14.4 毫米(据 Lynes, 引自 La Touche)。

Paradoxornis Heudei David, 1872, Compt. rend. Acad. Paris 74: 1450 (模式产地: 江苏南京); La Touche, 1925—30, 46—47; Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 442 ; 郑作新, 1976, 709。

(II) 小鸦雀亚属 *Suthora*

本亚属计有 9 种, 检索如次:

小鸦雀亚属 *Suthora* 分种检索

- 1. 仅具三趾 三趾鸦雀 *P. paradoxus*(267)
- 趾四个 2
- 2. 头顶灰色, 胸红色 灰冠鸦雀 *P. przewalskii*(281)
- 头顶非灰色; 胸非红色 3
- 3. 喉黑 橙背鸦雀 *P. nipalensis*(284)
- 喉非黑色 4
- 4. 眉纹显著 5
- 眉纹不显著或不存在 6
- 5. 背部橄榄褐色; 胸灰褐 褐鸦雀 *P. unicolor*(269)