



分布图 94 橙背鸦雀 *Paradoxornis nipalensis*

1. *P. n. crocotius* ○ 2. *P. n. poliotis* ● 3. *P. n. verreauxi* ⊙ 4. *P. n. craddocki* ⊖
 5. *P. n. pallidus* ◇ 6. *P. n. morrisonianus*

sis)。

关于本种的亚种,据 Deignan (in Mayr et Paynter, 1964), 计有 12 个之多, 其由见于我国者有 6 个。

亚 种 检 索

1. 上体乌橄榄褐色 台湾亚种 *P. n. morrisonianus*
 上体橙棕色 2
 2. 耳羽全灰, 或前黑后灰 滇西亚种 *P. n. poliotis*
 耳羽橙棕色 3
 3. 耳羽与背之间有灰色 藏南亚种 *P. n. crocotius*
 耳羽与背之间无灰色 4
 4. 上体橙棕色深浓 5
 上体橙棕色浅淡 挂墩亚种 *P. n. pallidus*
 5. 胸和腹以及两胁均纯白, 或仅微杂以棕色小斑 四川亚种 *P. n. verreauxi*
 胸和腹白而沾棕; 两胁大都棕色 瑶山亚种 *P. n. craddocki*

(1) 藏南亚种 *Paradoxornis nipalensis crocotius* Kinnear

分布于西藏东南部, 亦见于不丹东部。

形态参看前面检索。