

虹膜粉黄以至赭红色；嘴橙红，至制成标本后渐褪为橙黄色；脚橄榄褐以至黄褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅 尾
♂♂(6)	42.2 (40—44.3)	234 (230—246)	35.0 (34—35.5)	88.5 (78—92)
♀♀(5)	37.7 (33.5—44)	217 (201—226)	32.7 (31.7—34)	105.9 (102—110)

亚种分化 本种计有 4 个亚种，其中有 2 个见于我国云南省。

亚 种 检 索

上体赭褐；头顶转棕 滇南亚种 *P. o. ochraceiceps*

上体橄榄褐；头顶沾赭 滇西亚种 *P. a. austoni*

(1) 滇南亚种（指名亚种）*Pomatorhinus o. ochraceiceps* Walden

分布于我国云南省极南部西双版纳一带；在国外，见于缅甸北部及印度阿萨姆。

形态及量衡度见前。

P. pomatorhinus ochraceiceps Walden, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist. 12(4): 487 (模式产地：缅甸 Karen Hills)。

(2) 滇西亚种 *Pomatorhinus ochraceiceps austeni* Hume

分布于云南的极西部潞西、永德一带；在国外，仅见于印度阿萨姆。

上体淡橄榄褐，头顶呈棕黄色，与 *P. O. ochraceiceps* 相区别。

据中国科学院昆明动物研究所（1980），“幼鸟（4 月）眉纹白，头顶橄榄棕；上体较头顶淡；两翅表面棕黄，全部飞羽尚未长全；尾羽正换新羽，呈橄榄褐色；眼先、颊和耳羽棕褐；下体白色，雏羽尚未脱换，呈绒状；尾下覆羽与上体同色”。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(3)	33—40	220—253	33—37	90—92	105—118	31

Pomatorhinus austeni Hume, 1881, Str. Feath. 10:152 (模式产地：印度 Manipur)。

生态 栖于海拔 1,250—2,000 米高地的湿润而从生下木的山林中。检胃有螽螂（中国科学院昆明动物研究所, 1980）。

Pomatorhinus ochraceiceps Walden, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist. 12(4): 487 (模式产地：缅甸 Karen Hills)。

8. 红嘴钩嘴鹛 *Pomatorhinus ferruginosus* Blyth (图版一：5)

英名：Coral-billed Scimitar Babbler

地理分布 云南南部以至西藏墨脱县背崩（留鸟）；在国外，见于印度北部，尼泊尔，锡金，不丹，缅甸，泰国，老挝及越南北部。

鉴别特征 体形适中；嘴红而曲；头顶和头侧均黑，而具白眉；上体大都橄榄褐；喉白；胸锈红以至浅皮黄色。

形态（依据指名亚种）额羽长，居中者黑而具深栗色羽端，位于两侧者为栗棕色；头顶、颈项、眼先、颊及耳羽等均黑；眼上有白色眉纹，直伸至颈侧；上体包括两翅及尾等均橄榄褐色，尾羽沾棕；颏和喉白；胸以至腹部中央锈红色；下体余部橄榄褐色。雌雄相同。

虹膜金黄色；嘴深柑红色；脚铅褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	48	205	29	90	101	31
♀(1)	42	200	28	83	110	33

亚种分化 红嘴钩嘴鹛在我国有 2 个亚种的分化。

亚 种 检 索

头顶黑；胸以及腹部中央锈红色 指名亚种 *P. f. ferruginosus*

头顶棕褐；胸以及胸部中央浅皮黄色 滇南亚种 *P. f. orientalis*

(1) 指名亚种 *Pomatorhinus f. ferruginosus* Blyth

分布于西藏南部墨脱、背崩（留鸟）。

形态见上文。

Pomatorhinus ferruginosus Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal 14:597 (模式产地：印度的 Darjeeling)。

(2) 滇南亚种 *Pomatorhinus ferruginosus orientalis* Delacour

见于云南绿春及西部盈江，海拔 1,050 米(留鸟)。

头顶棕褐，各羽微具暗褐色狭缘；头侧具两道黑纹；眉纹白，直伸至后头；眼先、颊及耳羽均黑；上体余部包括两翅及尾的表面等均棕橄榄色，翅羽和尾羽沾棕较著；颏和喉均白；胸以及腹部中央浅皮黄色；下体余部与背略同，但较淡。

虹膜金黄；嘴桔红；脚绿褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	48	231	30	86	100	31 据魏天昊,1980)
♂(模式标本)	—	—	26	92	113	32 据 Delacour)

Pomatorhinus ferruginosus orientalis Delacour, 1927, Bull. Brit. Orn. Cl. 47:159 (模式产地：越南北部的 Tam Dao)。

生态 栖于茂密的树林、灌木丛及矮竹丛间。性甚活跃，在树木中跳动，犹如野鼠一样，除非被迫外，很少起飞。常见于海拔 900--2,000 米处。在云南西部，常见它与白头鹎混群。4 月间曾剖一胃，内含甲虫、鳞翅目幼虫及果实等。

Pomatorhinus ferruginosus Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal 14:597(模式产地：印度 Darjeeling)。

IV. 剑嘴鹛属 *Xiphirhynchus* Blyth, 1842

形态 这一属与钩嘴鹛属 (*Pomatorhinus*) 相似，仅有一个不同的特征，即嘴较长得