

米，都向下曲，且强健侧扁；鼻孔裸出，并不被羽；两翅短圆而弱，飞行仅短距离；尾较翅长，有时与翅等长，但都呈显著的凸尾状，其外侧尾羽不及中央一对全长的四分之一；脚较长而强，善于奔驰。

地理分布计 11 种。分布于我国中部和南部；在国外，见于中南半岛，缅甸，孟加拉国，印度，锡金，不丹，尼泊尔，巴基斯坦，斯里兰卡，马来半岛，印度尼西亚及澳大利亚。

*Pomatorhinus* Horsfield, 1821, Trans. Linn. Soc. London 13: 164. 模式种：*P. montanus* Horsfield.

参阅：Sharpe, 1883, 408—432; Baker, 1922, 205—224; Smythies, 25—29; Deignan (*in Mayr et Paynter*), 1964, 266—282; Ali *et* Ripley, 1971, 129—149。

Deignan, 1952, Proc. Biol. Soc., Wash. 65:119—124; *P. erythrogenys* 的评述。

郑作新, 1962. Acta Zool. Sinica 14:197: 218; 中国, *P. erythrogenys* 和 *P. ruficollis* 的评述; 1976, 603—608; de Schauensee, 1984, 367—368。

### 钩嘴鹛属 *Pomatorhinus* 分种检索

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. 有白色眉纹 .....                               | 2                                 |
| 无白色眉纹 .....                                  | 4                                 |
| 2. 胸部通常具纵纹；嘴非红色，嘴长在 25 毫米以下 .....            | 棕颈钩嘴鹛 <i>P. ruficollis</i> (24)   |
| 胸无纵纹；嘴呈红色，嘴长在 25 毫米以上 .....                  | 3                                 |
| 3. 嘴较短，长度在 30 毫米以下 .....                     | 红嘴钩嘴鹛 <i>P. ferrugineus</i> (31)  |
| 嘴较长，长度达 30 毫米以上 .....                        | 棕头钩嘴鹛 <i>P. ochraceiceps</i> (30) |
| 4. 嘴不较头长，一般不超过 35 毫米；嘴亦较细；耳羽锈红色；胸具黑色粗纹 ..... | 锈脸钩嘴鹛 <i>P. erythrogenys</i> (18) |
| 嘴较头长，达 40 毫米；嘴形较粗；耳羽淡褐以至灰褐色；胸无黑色粗纹 .....     | 长嘴钩嘴鹛 <i>P. hypoleucus</i> (16)   |

#### 4. 长嘴钩嘴鹛 *Pomatorhinus hypoleucus* (Blyth) (图版一：1)

英名：Long-billed Scimitar Babbler


地理分布 广西南部、云南南部西双版纳及广东的海南岛；在国外，自越南、老挝、泰国、缅甸以至印度阿萨姆和孟加拉国等均有分布。

鉴别特征 体形大小与画眉相似；嘴强长而下曲；上体大都橄榄褐色；下体白而带棕；两胁大都褐灰；跗蹠长而强。

形态（依据西南亚种）上体橄榄褐色，背部以下沾棕，两翅的覆羽亦然，飞羽内翈乌褐；外翈棕褐；眼先乌灰，颊和耳羽灰褐；耳羽上面有一条杂以锈红色的棕白纵纹直伸至颈侧；此处棕白色椭圆纹更多，有时还杂以锈红色，有时完全变为锈红色；额、喉、胸及腹等均白而带棕，胸微有黑纹，胸侧黑纹尤著，尾下覆羽锈褐，两胁橄榄褐；腋羽灰。

虹膜褐以至紫褐色；嘴淡角色，嘴峰大部稍暗，脚及趾均铅灰色，爪黄。

量衡度：



分布图 3 长嘴钩嘴鹛 *Pomatorhinus hypoleucus*

1. *P. h. tickelli* ○ 2. *P. h. hainanus* ●

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跟
♀(2)	79—93	250—263	37—38	95—98	99	37—39
♂(1)	100	270	42	103	107	40

亚种分化 计 4 个亚种; 国内有 2 个。

#### 亚 种 检 索

体形较大, 翅长在 95 毫米以上, 胸部中央有黑点或黑纹 .....西南亚种 *P. h. tickelli*  
体形较小, 翅长一般在 94 毫米以下; 胸部无黑点或黑纹 .....海南亚种 *P. h. hainanus*

除上述的两亚种以外, 郑作新 (1962) 还记述 *P. h. laotianus* Delacour, 于 1928 年 10 月采自广西 (任国荣和常麟定, 1937), 但因仅有一 ♀, 而无比较资料, 故把这一亚种冠以“?”号。现据 Deignan (1964), *P. h. laotianus* 应作为 *P. h. tickelli* 的同物异名。

#### (1) 西南亚种 *Pomatorhinus hypoleucus tickelli* Hume

分布在云南及广西; 在国外, 见于越南, 老挝, 泰国及缅甸。

形态详见上文。

*Pomatorhinus Tickelli* Hume, 1877, Stray Feath. 5: 32 (模式产地: 缅甸 Tenasserim).

#### (2) 海南亚种 *Pomatorhinus hypoleucus hainanus* Rothschild

仅分布于海南岛。

体形较 *P. h. tickelli* 为小；翅长在 94 毫米以下，而后者在 95 毫米以上；本亚种的嘴峰亦较短，一般为 35—36 毫米，而 *P. h. tickelli* 大都在 36 毫米以上，本亚种的下背及腰等较少棕色；胸部中央无黑点或黑纹。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂(1)	76	216	35	96	94	37
♀(1)	60	230	36	86	82	35


*Pomatorhinus tickelli hainanus* Rothschild, 1903, Bull. Brit. Orn. Cl. 14:9 (模式产地：海南岛)

生态 此种钩嘴鹛性好栖于地面上，非不得已不飞到树上，常喜于常绿森林的稠密的下木中及广泛沼泽地的竹丛和甘蔗丛间。平时单独或成对活动，有时成群并与其它鹛类混在一起。叫声似笛音 (Deignan)，三声一度 (Baker)，很嘹亮悦耳似“hoot, hoot, hoot” (Ali)；常仅闻它的叫声，而见不到其鸟。食以昆虫、木虱、小形螺壳及蜗牛等。

*Orthorhinus hypoleucus* Blyth, 1844, Journ. As. Soc. Bengal 13: 371 (模式产地：缅甸 Arakan)。

5. 锈脸钩嘴鹛 *Pomatorhinus erythrogenys* Vigors (图版一: 2)

英名：Rusty-cheeked Scimitar Babbler



分布图 4 锈脸钩嘴鹛 *Pomatorhinus erythrogenys*

- 1. *P. e. dedekeni* ○
- 2. *P. e. cowensae* ●
- 3. *P. e. decarlei* ○
- 4. *P. e. odicus* ○
- 5. *P. e. gravivox* ◇
- 6. *P. e. swinhonis* ♦
- 7. *P. e. abbreviatus* ★
- 8. *P. e. erythrocnemis*