

虹膜粉黄以至赭红色；嘴橙红，至制成标本后渐褪为橙黄色；脚橄榄褐以至黄褐色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅 尾
♂♂(6)	42.2 (40—44.3)	234 (230—246)	35.0 (34—35.5)	88.5 (78—92)
♀♀(5)	37.7 (33.5—44)	217 (201—226)	32.7 (31.7—34)	105.9 (102—110)

亚种分化 本种计有 4 个亚种，其中有 2 个见于我国云南省。

亚 种 检 索

上体赭褐；头顶转棕 滇南亚种 *P. o. ochraceiceps*

上体橄榄褐；头顶沾赭 滇西亚种 *P. a. austoni*

(1) 滇南亚种（指名亚种）*Pomatorhinus o. ochraceiceps* Walden

分布于我国云南省极南部西双版纳一带；在国外，见于缅甸北部及印度阿萨姆。

形态及量衡度见前。

P. pomatorhinus ochraceiceps Walden, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist. 12(4): 487 (模式产地：缅甸 Karen Hills)。

(2) 滇西亚种 *Pomatorhinus ochraceiceps austeni* Hume

分布于云南的极西部潞西、永德一带；在国外，仅见于印度阿萨姆。

上体淡橄榄褐，头顶呈棕黄色，与 *P. O. ochraceiceps* 相区别。

据中国科学院昆明动物研究所（1980），“幼鸟（4月）眉纹白，头顶橄榄棕；上体较头顶淡；两翅表面棕黄，全部飞羽尚未长全；尾羽正换新羽，呈橄榄褐色；眼先、颊和耳羽棕褐；下体白色，雏羽尚未脱换，呈绒状；尾下覆羽与上体同色”。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(3)	33—40	220—253	33—37	90—92	105—118	31

Pomatorhinus austeni Hume, 1881, Str. Feath. 10:152 (模式产地：印度 Manipur)。

生态 栖于海拔 1,250—2,000 米高地的湿润而从生下木的山林中。检胃有螽螂（中国科学院昆明动物研究所, 1980）。

Pomatorhinus ochraceiceps Walden, 1873, Ann. Mag. Nat. Hist. 12(4): 487 (模式产地：缅甸 Karen Hills)。

8. 红嘴钩嘴鹛 *Pomatorhinus ferruginosus* Blyth (图版一：5)

英名：Coral-billed Scimitar Babbler

地理分布 云南南部以至西藏墨脱县背崩（留鸟）；在国外，见于印度北部，尼泊尔，锡金，不丹，缅甸，泰国，老挝及越南北部。

鉴别特征 体形适中；嘴红而曲；头顶和头侧均黑，而具白眉；上体大都橄榄褐；喉白；胸锈红以至浅皮黄色。