

眼先近黑，与指名亚种接近；短髭纹灰黑，近于 *S. c. aurata*；全身黄色部分则介于指名亚种与 *S. c. aurata* 之间。由于标本少，又普遍有狐变现象，盈江一带的金头穗鹛有待采得更多标本以确定其从属。

亚种分化计 6 个亚种，中国有 2 个亚种。

亚 种 检 索

上体浓金黄色 指名亚种 *S. c. chrysaea*
 上体呈橄榄绿染黄 滇南亚种 *S. c. aurata*

(1) 指名亚种 *Stachyris chrysaea chrysaea* Blyth

云南西北部贡山、西藏墨脱背崩(留鸟)，在国外，分布于尼泊尔，锡金，不丹，印度阿萨姆和缅甸北部。

本亚种与分布在云南南部和东南部的 *S. c. aurata* 易于区别，头部以及上体均较后者富于金黄，呈浓金黄色，而 *S. c. aurata* 头部金黄，上体为橄榄绿染黄；下体鲜黄，与 *S. c. aurata* 下体黄色浅淡易于区别；耳羽金黄，渲染以褐色；眼先、髭纹黑色，不同于 *S. c. aurata* 的耳羽黄色缀灰，眼先和髭纹为石板黑色。

虹膜金黄褐或浅褐色；嘴角褐，下嘴基部浅淡；脚浅肉黄色。

量衡度

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂ 1)	8	103	—	50	45	19

Stachyris chrysaea Blyth ex Hodgson, 1844, Journ. As. Soc. Bengal 13: 379 (模式产地：尼泊尔)。

(2) 滇南亚种 *Stachyris chrysaea aurata* de Schauensee

云南南部勐腊、绿春、东南部屏边(留鸟)；在国外，分布于缅甸掸邦，老挝北部和越南北部。

形态详见种的描述。

本亚种头顶金黄色，与指名亚种头顶呈浓金黄色有别；上体橄榄绿染黄，与指名亚种上体呈浓金黄色相区别；眼先和髭纹灰黑，指名亚种则呈黑色；下体浅黄，与指名亚种下体为金黄色明显有别。

Stachyris chrysaea aurata de Schauensee, 1938, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. 90: 29 (模式产地：泰国 Doi Pha Hom Pok)。

生态 栖于海拔约 900—1,250 米热带雨林、沟谷林下灌丛、草丛，或细竹林间。此鸟数量不多。冬季曾见结群。4 月下旬在云南南部绿春观察得此鸟已成对活动。

剖检 4 月(2 只)和 6 月(1 只)的 3 只鸟，其胃内含物，纯系昆虫，有甲虫(2 次)，蜻蜓及蛾类(各 1 次)。

1956 年 6 月 19 日在云南东南部屏边大围山牛厂获得 1 只初飞的雄性幼鸟，体重 7 克，全长 85 毫米，嘴峰 9.5 毫米，翅长 42.5 毫米，尾长 24 毫米，跗蹠 15 毫米；形态详见前