

S. ruficeps 的淡灰黄或淡黄色相区别。羽色有狐变现象,新鲜标本上体有绿色渲染,下体有明显的黄色;陈旧标本上体和尾显然狐变为浅褐色,翅表转呈茶褐色,下体无黄色渲染,为淡褐灰色,喉部未见黑色短轴纹。

亚种分化 共计 7 个亚种,分布于中国的有 4 个亚种。

亚 种 检 索

- 1. 头顶棕红色 2
- 头顶栗红色 3
- 2. 头顶棕红色延及枕部 滇西亚种 *S. r. bhamoensis*
- 头顶棕红色不延及枕部 普通亚种 *S. r. davidi*
- 3. 头顶栗红色范围较大 海南亚种 *S. r. goodsoni*
- 头顶栗红色范围较小 台湾亚种 *S. r. pracognita*

(1) 滇西亚种 *Stachyris ruficeps bhamoensis* (Harington)

云南西北部贡山、维西、鸡足山,西部腾冲、潞西、凤庆(留鸟);在国外,分布于缅甸东北部克钦邦和掸邦。

本亚种头顶羽色与 *S. r. davidi* 同为棕红色,唯范围较大,延至枕部;与 *S. r. davidi* 的区别在于嘴峰较长,大于 14 毫米,后者不及 14 毫米;与 *S. r. bhamoensis* 的区别为后者头顶羽色栗红而非棕红色。同期采的收藏的陈旧标本(十余年)之间的区别特征为 *S. r. bhamoensis* 上体橄榄褐(新鲜标本微染绿色),*S. r. davidi* 上体由橄榄绿色转为褐色;额基、眼上方、颊、耳羽、颞、喉、以至下体与 *S. r. bhamoensis* 均不如 *S. r. davidi* 之为浅显的浅黄色显著,胁部较 *S. r. davidi* 多染灰橄榄褐色,新鲜标本则几与 *S. r. davidi* 陈旧狐变的标本相似;二者极陈旧的标本其黄色均狐变为浅灰褐或褐灰色。为此,作为对比,除头顶棕红色范围大小与收藏时间长短无关外,其余体色只有以同期采的进行比较,才能区别彼此间的差异。

1964 年 10 月 11 日和 11 月 11 日于云南景东黄草岭和磨刀河采得的 2♂♂,上体橄榄绿色与同期采的 *S. r. bhamoensis* 相似;而同年 8 月 14 日和 24 日采自景东磨刀河和温卜的 2♂♂,上体则与采自云南西部的 *S. r. davidi* 同为橄榄褐色。*S. r. bhamoensis* 与 *davidi* 在云南境内的过渡地带当在无量山一带。

Stachyridopsis bhamoensis Harington, 1908, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) 2: 245 (模式产地:缅甸 Sinlum-kaba 八莫地区)。

Stachyridopsis ruficeps bhamoensis, Baker, 1922 1: 269.

Stachyris ruficeps bhamoensis, 昆明动物研究所, 1980, 176。

(2) 普通亚种 *Stachyris ruficeps davidi* (Oustalet)

陕西南部西乡,四川成都、重庆、綦江、南充、万源、南江、秀山、彭水、南川、屏山、泸县、富顺、乐山、峨眉、甘洛、马边、峨边、雅安、宝兴、灌县、康定,云南绥江、盐津、漾濞、蒙自、屏边、河口大围山,贵州赤水、绥阳、江口、贵定、兴义、兴仁、册亨、望谟、罗甸、雷山、榕江、从