



分布图 82 黑颈凤鹛 *Yuhina nigrimenta*

1. *Y. n. intermedia* ○ 2. *Y. n. pallida* ●

亚种检索

上体橄榄灰色，下体棕黄色较淡 东南亚种 *Y. n. pallida*
 上体橄榄褐色，下体棕黄色较浓 西南亚种 *Y. n. intermedia*

(1) 西南亚种 *Yuhina nigrimenta intermedia* Rothschild

国内见于四川中部和东部，湖北西南部，云南西北部以至东南部，西藏南部；在国外，见于缅甸，老挝，越南等。

耳羽灰色，上体较 *Y. n. pallida* 色浅略沾褐色；下体棕黄色较深，胸、腹部更浓。量衡度见上文。

Yuhina nigrimenta intermedia Rothschild, 1922, Bull. Brit. Orn. Cl. 43: 11 (模式产地：云南西北部澜沧江流域及怒江和澜沧江间山脉)。

Yuhina nigrimentum quarta Riley, 1930, Proc. Biol. Soc. Wash. 43: 134 (模式产地：四川)。

(2) 东南亚种 *Yuhina nigrimenta pallida* La Touche

仅分布于我国广西东北部龙胜一带及福建西北部。

耳羽灰色沾褐；上体较 *Y. n. intermedia* 色深、略沾灰色；下体棕黄色较淡，喉、胸部近白。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(3)	13—14	115—120	11—12	57—58	46—48	17—19
♀♀(4)	12	105—120	10—12	54—56	44—48	17—19
♀(2)	12	114—117	11	55—57	46—48	17

Yuhina pallida La Touche, 1897, Bull. Brit. Orn. Cl. 6: 50 (模式产地: 福建挂墩)。

生态 此鸟常结小群或与其他小鸟混群。夏季活动于海拔 1,000—1,800 米间的常绿阔叶林及谷间灌丛中。性活泼、爱喧闹,上下窜跳、觅食于高耸的树冠、小树枝间或灌丛下层,有时亦活动于树下较高的草丛间;冬季活动范围,降低到海拔 300 米左右高度的地区。食物以种子为主,兼吃一部分昆虫和花蜜。

Yuhina nigrimenta Blyth, 1845, Journ. As. Soc. Bengal 14: 562 (模式产地: 尼泊尔); Deignan (in Mayr et Paynter), 1964, 425—426; 郑作新, 1976, 693。

114. 白腹凤鹛 *Yuhina zantholeuca* (Blyth)

英名: White-bellied Herpornis

地理分布 见于云南,广西,广东(包括海南岛),福建,台湾等;在国外,见于印度阿萨姆,缅甸,泰国,柬埔寨,老挝,越南,马来半岛和印度尼西亚苏门答腊、加里曼丹等。

鉴别特征 有明显的羽冠,头顶、上体、飞羽外缘和尾羽均黄绿色,尾羽边缘黄色,飞羽黑色,眼先、耳羽和下体灰白色,尾下覆羽黄色,雌雄同色。

形态(依据滇西亚种的标本)背面通体淡黄绿色;前额和头顶羽轴中央微黑色,有明显的羽冠;飞羽黑色,外翮与背部同色,翅上覆羽外翮与背部同色,小翼羽灰褐色,小覆羽和最内侧次级飞羽与背部同色,背部淡绿黄色;腋下黄色;尾羽黄绿色,羽缘鳞黄色;眼先、颊部、耳羽和下体(从颈部到下腹)均灰白色;尾下覆羽鲜黄色。两性同色。

虹膜褐色;上嘴浅褐色,下嘴浅肉色;跗蹠及趾肉黄色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(6)	11—14	110—126	11—13	66—68	53—59	18—20
♀♀(3)	10—12	104—118	12—13	64—65	48—54	18—19

亚种分化 本种计有 8 个亚种,分布于我国计有 3 个亚种。

亚种检索

1. 上体黄绿色,黄色较隐而绿色较暗;下体污灰 华南亚种 *Y. z. griseiloris*
 上体淡黄绿色,黄色较显而鲜亮;下体灰白色 2
2. 翅较长 6♂ 66—68 毫米,3♀ 64—65 毫米 滇西亚种 *Y. z. zantholeuca*
 翅较短,9♂ 58—65 毫米,8♀ 56—61 毫米 海南亚种 *Y. z. tyrannula*

(1) 滇西亚种 *Yuhina zantholeuca zantholeuca* (Blyth)

国内见于云南西北部和西南部贡山、泸水、腾冲、盈江、潞西等地;在国外,见于印度阿萨姆,孟加拉国,缅甸,泰国。