

不丹, 孟加拉国北部, 印度(北部和阿萨姆邦)。

形态 上体概暗棕褐色; 头具一淡皮黄色眉纹延伸至后颈; 下体淡棕色, 胸、两胁和下腹棕色较浓。

本亚种与华南亚种 *C. f. davidiana* 比较, 下体淡棕色较显, 腋羽的黄色亦较浓。嘴稍长, 翅和尾较短。

(2) 华南亚种 *Cettia fortipes davidiana* (Verreaux, 1870)

Arundianax davidiana Verreaux, 1870. Bull. Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. Paris, 6: 3 (Baoping, Sichuan, China).

Cettia sinensis La Touche, 1898. Bull. Brit. Orn. Cl. 7: 37 (Fujian, China).

Antionis grahami Ripley, 1926. Proc. Biol. Soc. Wash. 39: 55 (Emei Mt., Sichuan, China).

Horeites fortipes davidiana Rothschild, 1926. Novitates zoologicae, Vol.33 (3): 284.

Cettia fortipes davidiana Howard & Moore, 1980: 438; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 12; Cheng Tso-Hsin, 1987: 768; 1994: 138; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 346; Yang Lan *et al.*, 2004: 542—543.

分布 陕西(宁陕、西乡、洋县、佛坪、留坝、周至)、甘肃(文县、天水)、贵州(咸宁、赫章、水城、遵义、绥阳、印江、江口、贵阳、清镇、惠水、罗甸、贵定、丛江)、重庆(城口、秀山、南川)、四川(成都、南充、苍溪、万源、南江、宜宾、屏山、乐山、峨眉、甘洛、美姑、雷波、马边、峨边、雅安、天全、宝兴、西昌、都江堰、若尔盖)、云南(贡山、腾冲、蒙自)、河北(东陵、沁水)、湖北(武昌、永顺)、上海、浙江(杭州、临安、宁波)、江西(南昌)、福建(武夷山、福州)、广东北部(留鸟); 国外无分布。

形态 详见种的描述。

(3) 台湾亚种 *Cettia fortipes robustipes* (Swinhoe, 1866)

Horeites robustipes Swinhoe, 1866. Ibis: 398 (southern Taiwan, China).

分布 为我国台湾特有亚种; 国外无分布。

形态 与指名亚种 *C. f. fortipes* 和华南亚种 *C. f. davidiana* 不同, 下体呈淡黄褐色。

生态 强脚树鸫主要栖息于海拔 1600—2400 m 高度阔叶树丛和灌丛间, 在草丛或绿篱间也常见到。冬季也出没于山脚和平原地带的果园、茶园、农耕地及村舍竹丛或灌丛中。经常不停地穿梭于茂密的枝间, 发出“zhe, zhe, zhe”的叫声, 常常只闻其声, 不见其影。春夏之间常作“er-jinsui”或“er-jinsui qi”的叫声, 清脆而洪亮, 从早到晚久鸣不休。

嗜食昆虫, 亦兼食一些植物性食物, 如野果和杂草种子等。

在秦岭地区, 于 4—10 月检查 14 胃, 发现它们嗜吃昆虫, 主要有鳞翅目幼虫、甲虫、象甲及膜翅目昆虫等, 也兼食一些植物, 如野果和杂草种子(郑作新等, 1973); 在