

分类讨论 金头扇尾莺是多型种鸟类，全世界共计有 13 亚种，我国分布有 3 亚种，即华南亚种 *C. e. courtoisi*、滇西亚种 *C. e. tytleri* 和台湾亚种 *C. e. volitans*。

亚种检索表

- 1. 头顶金黄色..... 滇西亚种 *C. e. tytleri*
- 头顶非金黄色..... 2
- 2. 头顶苍白沾烟灰色；上体烟黑色，具灰褐羽缘；下体喉和腹近白，余部皮黄色.....
- 华南亚种 *C. e. courtoisi*
- 头顶至后颈黄白色有丝冠；上体灰褐色有黑色斑点；下体稍带黄褐色，腹部黄白色.....
- 台湾亚种 *C. e. volitans*

(1) 华南亚种 *Cisticola exilis courtoisi* La Touche, 1928

Cisticola exilis courtoisi La Touche, 1928. Handb. Bds. East. China 1: 237 (Hekou, Yunnan, China).
Cisticola exilis courtoisi Howard & Moore, 1980: 450; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 124; Cheng Tso-Hsin, 1987: 834; 1994: 148; Peng Yan-Zhang, 1987: 369—370; Yang Lan *et al.*, 2004: 614.

分布 贵州(贵阳、榕江)、云南(东南部河口)、湖南(资兴)、安徽南部、江苏、江西北部、福建(邵武)、广东、广西(瑶山、柳州)、香港(留鸟)。我国特有亚种。

形态 详见种的描述。

(2) 台湾亚种 *Cisticola exilis volitans* (Swinhoe, 1859)

Calamanthella volitans Swinhoe, 1859. Journ. N. China Br. Roy. As. Soc. 1(2): 226 (northeastern Taiwan, China).

分布 我国特有亚种，仅见于台湾。

形态 头顶至后颈黄白色，上体灰褐色，有黑色斑点；尾羽黑褐，先端白色；下体稍带黄褐色，腹部黄白色。

(3) 滇西亚种 *Cisticola exilis tytleri* Jardon, 1873

Cisticola tytleri Jerdon, 1873. Bds. Ind. 2: 176 (Dacca, Bangladesh).
Cisticola exilis tytleri Ali & Ripley, 1973: 31—32; Stuart Baker, 1924, 2: 420—421; Howard & Moore, 1980: 450; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 123; Cheng Tso-Hsin, 1987: 834; 1994: 148; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 370.

分布 云南(西部、盈江)；尼泊尔，孟加拉国，印度北部。

形态 本亚种头顶金黄色，明显地有别于头顶至后颈黄色有羽冠的台湾亚种 *C. e. volitans* 和头顶苍白沾烟灰色的华南亚种 *C. e. courtoisi*。