

亚种检索表

1. 喉和胸非赭红栗色 2
- 喉和胸赭红栗色；下胸及胸侧较暗并杂有褐色；两胁橄榄褐色；腹部茶黄色；尾下覆羽白色 滇南亚种 *F. h. annamensis*
2. 喉和胸橙棕色；下胸及胸侧较淡；两胁淡黄棕色；腹、尾下覆羽均白色杂有褐色 指名亚种 *F. h. hyperythra*
- 喉和胸橙栗色，渐次更淡；两胁栗色；腹、尾下覆羽均白色 台湾亚种 *F. h. innexa*.

(1) 指名亚种 *Ficedula hyperythra hyperythra* (Blyth, 1842)

Muscicapa hyperythra Blyth, 1842. Journ. As. Soc. Bengal 11: 885 (Darjeeling, India, and Nepal).

Muscicapa hyperythra hyperythra Ali & Ripley, 1972, 7: 163—164; Rothschild, 1926: 291.

Ficedula hyperythra hyperythra Howard & Moore, 1980: 472; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 344; Cheng Tso-Hsin, 1987: 848; 1994: 150; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 377—378; Yang Lan et al., 2004: 638.

分布 云南南部及西南部(繁殖鸟)。

形态 详见种的记述。

(2) 滇南亚种 *Ficedula hyperythra annamensis* (Robbinson et Kloss, 1919)

Dendrobiastes hyperythra annamensis Robinson et Kloss, 1919. Ibis: 445 (Longbian Peaks, northern Vietnam).

分布 云南(澜沧、河口)(3—4月)、广西、海南。

形态 雄性成鸟 与指名亚种相似，但它的喉、胸部为赭红栗色；下胸、胸侧及两胁较暗，并杂以褐色；腹部茶黄色，中央白色，尾下覆羽亦白色。

虹膜深褐色；嘴黑色；跗蹠肉红色。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(4)	9(3) (8—10)	121(3) (110—130)	11.5	59.75(4) (59—61)	41.5(4) (40—43)	15(4) (15—16)

(3) 台湾亚种 *Ficedula hyperythra innexa* (Swinhoe, 1866)

Siphia innexa Swinhoe, 1866. Ibis (2) 2: 394 (Taiwan, China).

分布 仅见于我国台湾阿里山区(繁殖鸟)。

形态

雄性成鸟 似指名亚种，但喉、胸部为橙栗色，自下胸起，渐次浅淡，至腹部及尾