

**生态** 多成对或单个活动于山地灌丛中间，在西藏聂拉木地区，活动于 2000 m 以下的阔叶林中，灌丛中；在秦岭南坡的宁陕，它在 1350 m 的山地栖息于底枝、树椿或溪沟边的岩石上。往往从栖息处突然起飞至空中捕捉昆虫为食；有时可以见到它从栖息的树枝上降落到地面上，啄食昆虫。栖息时，不时地将尾羽向上翘起，并轻轻张开，露出白色的基部。5 月在西藏聂拉木剖检一胃，内有叶甲；在秦岭剖检一胃，内是甲虫及草籽等。它的繁殖时间，约在 5 月底 6 月初，5 月聂拉木雄鸟生殖腺已达 6 mm×4 mm，显然已达到繁殖阶段。6 月上旬在珠峰地区猎获一雌鸟，腹中有一枚将产出的卵，同时在一棵粗大冷杉树上发现有一个巢，筑在离地面 1.2 m 的树洞中，巢宽 45 mm，内垫松萝、羊毛和苔藓等。鸣声为细薄金属般的“tin-ti-ti”声，第一声响亮，后两声轻(约翰·马敬能等，2000)。

**102. 白喉[姬]鶺鴒 *Ficedula monileger* (Hodgson, 1845)**

**英文名** White-gorgetted Flycatcher

*Dimorpha monileger* Hodgson, 1845. Proc. Zool. Soc. London: 26 (Nepal).

**分布** 仅见于云南(西南部、西盟的南卡河)；印度(阿萨姆邦和北部)以及东南亚地区。

**鉴别特征** 两性羽色相似。上体大都橄榄褐色，眉纹短阔而呈白色。喉、胸部具有三角形白色块斑。

**形态**(据云南西盟采得的标本描述)

成鸟：两性羽色相似，上体橄榄褐色。前额两侧白色，左右几乎相遇嘴基，形成一道短而阔的眉纹；眼先和耳羽灰褐色；翅上覆羽似背部的橄榄褐色，初级覆羽及飞羽暗褐色；初级飞羽与内侧次级飞羽棕褐色，尾羽亦棕褐色。喉白色，周围镶以较宽阔的黑边；胸和两胁浅橄榄褐色；腹部和尾下覆羽白色；腋羽灰黑色，而具白端。

虹膜暗褐色；嘴角褐色；跗蹠和趾肉白色。

**量衡度**

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂(1)	10	115	12	63	47	18

**亚种分化** 白喉[姬]鶺鴒有 3 亚种，但见于我国的仅云南亚种 *F. m. leucops*。

**(1) 云南亚种 *Ficedula monileger leucops* (Sharpe, 1888)**

*Digenea leucops* Sharpe, 1888. Proc. Zool. Soc. London: 246 (Shillong, Assam, India).

*Muscicapa monileger leucops* Ali & Ripley, 1972, 7: 162; Smythies, 1986: 319—320.

*Ficedula monileger leucops* Howard & Moore, 1980: 472; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 342-343; Cheng Tso-Hsin, 1987: 848; 1994: 150; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 377; Yang Lan *et al.*, 2004: 637.

**分布和形态** 详见种的描述。

**生态** 多活动于阔叶林中的灌丛间，常在离地面不高的地方取食，在空中追捕昆虫，有时亦在地面寻食。在地面行走时，用跳跃的方式前进。栖在树枝上时，常将尾羽向上翘起并张开。

国内至今没有此鸟的繁殖资料。在印度，4月底5月初繁殖。巢筑在稠密的灌丛中，离地仅几厘米。巢呈球状，由苔藓、草、叶等物构成，形甚粗糙。卵每窝4枚，白色，其上有淡红色小点，并在大端形成一个色环。鸣声似“dik”短促哨音(约翰·马敬能等，2000)。

### 103. 棕胸蓝[姬]鹟 *Ficedula hyperythra* (Blyth, 1842) (图 91)

**别名** 褐色胸蓝鹟(鸟类目录试编)，黄胸青鹟(台湾)

**英文名** Rufous-breasted Blue Flycatcher

*Muscicapa hyperythra* Blyth, 1842. Journ. As. Soc. Bengal 11: 885 (Darjeeling, India, and Nepal).

**分布** 四川、云南、广西、海南(繁殖鸟)，台湾(罕见鸟)；印度(阿萨姆邦和北部)，尼泊尔，缅甸，泰国，越南，马来西亚，印度尼西亚等地。

**鉴别特征** 雄鸟上体石板蓝色，有一显著的白色眉纹；颈黑，喉及胸等均橙棕色。雌鸟上体橄榄褐色，眉纹及眼圈淡黄色；下体的橙棕色较雄鸟浅淡。

**形态**(1957年3月17日，采自云南橄榄坝的指名亚种标本)

**雄性成鸟** 上体石板蓝色，有一显著而宽阔白色眉纹，从前额向后伸延达眼的上方；有一条狭小的前额线和眼先、颈及两颊等黑色；肩羽和翅上覆羽均与背部同色，大覆羽略褐色，末端赭色；飞羽褐色，羽缘橄榄褐色；尾暗褐色；外侧尾羽各具白色显著羽基。喉、胸橙棕色，下胸及两胁逐渐变浅，至腹部及尾下覆羽，几乎近白色。

**雌性成鸟** 上体包括两翅和尾等均橄榄褐色，在腰及尾上覆羽稍沾棕黄色；飞羽和尾羽的羽缘浅棕色。下体棕黄色，胁部灰褐色，喉及腹部变浅，几乎近黄白色。

**雌性幼鸟**(1956年6月22日采自云南屏边) 上体暗褐色，头顶和背部具棕黄色羽干斑，至腰部则逐渐消失。下体暗黄色，在胸部稍深浓，各羽有暗褐色，羽缘和斑点，形成鳞状。

虹膜暗褐色；嘴黑色；跗蹠肉红色。

#### 量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(4)	8.4	103	12.1	58.5	42.5	17.9
	(8—9)	(99—110)	(12—12.5)	(53—61)	(41—43)	(17—18.5)
♀(1)		118	11.5	60	41	17.5

**亚种分化** 棕胸蓝[姬]鹟有20亚种，国内纪录有3亚种。