

形态(根据采自滇西盈江的西南亚种 *F. w. australorientis* 标本描述)

雄性成鸟 上体包括眼先、脸侧及颈侧等均黑色，有一明显的白色眉纹，从眼先向后延伸到颈部；两翅上部黑色，内侧大覆羽，次级飞羽的外缘均白色，形成一个大形块斑；尾羽亦黑色，外侧尾羽基部均白色。下体几乎纯白色，仅上胸两侧黑色，腋羽及翅下覆羽亦白色。

雌性成鸟 上体大都橄榄褐色，额、眼先及眼圈等稍沾浅棕色，腰羽褐色变浅；尾上覆羽则几乎近棕色；尾羽暗褐色。下体污白色，腋羽白色，稍沾浅黄色。

雄性幼鸟(1928年8月26日采自广西瑶山) 上体黑褐色，头及背部具大而浅褐色的斑点，大覆羽具淡褐色尖端，内侧次级飞羽的外翈绿白色，形成一个翅斑。下体白色。

虹膜暗褐色；嘴黑色；跗蹠亦黑色。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(10)	7.2 (5—8)	108.2 (103—116)	11.7 (10.5—12)	57.7 (55—61)	47.2 (43—60)	13.9 (13—14)
♀♀(4)	7.4 (7—8.5)	10.5 (101—111)	11.8 (11.5—12)	55.6 (55—56.5)	42.8 (42—43)	14

亚种分化 据 Ripley(1952)，本种共有7个亚种，其中只有1个亚种见于国内。

(1) 西南亚种 *Ficedula westermanni australorientis* (Ripley, 1952)

Muscicapa westermanni australorientis Ripley, 1952. Proc. Biol. Soc. Wash. 65: 72 (Phou Kobo Laos).

Muscicapa westermanni australorientis Ali & Ripley, 1972, 7: 167.

Ficedula westermanni australorientis Howard & Moore, 1980: 473; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 350;

Cheng Tso-Hsin, 1987: 850—851; 1994: 150; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 378—379; Yang Lan et al., 2004: 640.

分布 西藏(朗县洞嘎、墨脱县汗密)、云南(西部腾冲、北部丽江、南部西双版纳)、广西(瑶山)。

形态 见种的描述。

生态 小斑[姬]鹟是我国的夏候鸟。生活在海拔1000—1650 m的山地树林中。常单个或结成小群活动于山坡阔叶林中，亦见于山坡杜鹃灌丛间，大多在树丛间做小距离的飞翔，从一棵树飞到另一棵树上。它以典型的鹟类捕食方法捕食在空中飞行的昆虫。我们于1964年在滇西剖检两只鸟胃，其内含的食物主要是膜翅目蚂蚁、鞘翅目甲虫、鳞翅目幼虫等。