

39. 草绿篱莺 *Hippolais pallida* (Hemprich et Ehrenberg, 1833)

英文名 Olivaceous Warbler

Currca pallida Hemprich et Ehrenberg, 1833. Symb, Phys. Avium. Decas I, fol. bb and note 3 (the Nile in Egypt and Nubia).

分布 仅分布于新疆(伊犁、克拉玛依、准噶尔盆地、吐鲁番盆地)(繁殖鸟); 欧洲东南部, 北非, 撒哈拉, 埃及, 巴尔干半岛, 小亚细亚, 高加索, 黑海, 中东, 伊朗, 阿富汗, 塔吉克斯坦, 中亚等地, 越冬于非洲。

鉴别特征 小型鸟类(体长 13—15 cm)。上体灰褐色稍染橄榄色; 眼周和眉纹白色或淡茶褐色。下体白色而沾赭色。

形态 雌雄两性羽色相似。上体灰褐色微染以橄榄色; 两翼覆羽和飞羽外表与背同为灰褐色微染以橄榄色, 飞羽黑褐色, 第 1 枚飞羽短小, 一般不及初级覆羽的长度; 飞羽式为 6>2>7, 有时也为 7>2>8, 或者 5>2>6, 第 3 枚和第 4 枚最长, 且几乎相等; 尾亦为暗褐色, 羽缘色淡; 眼先白色而杂以暗色, 眉纹白色或淡茶黄色, 仅限于眼先上面至眼前一段, 有时也延伸至眼上, 但不明显; 眼周白色或淡茶黄色。下体白色, 稍染黄赭色; 两胁微沾褐色。

虹膜褐色; 上嘴暗褐或角褐色, 下嘴黄绿或肉褐色; 脚和爪黄灰色。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂	11.6	130—155	14—17	63—68	52—58	20—22
♀	—	—	12.5—14.5	63—65	50—58	—

分类讨论 草绿篱莺为多型种, 全世界共计 5 亚种, 即普通亚种 *H. p. elaeica*、指名亚种 *H. p. pallida*、地中海亚种 *H. p. opaca*、北非亚种 *H. p. reseri* 和乍得亚种 *H. p. laeneni*, 分布于我国境内的, 仅有普通亚种 *H. p. elaeica*。

(1) 普通亚种 *Hippolais pallida elaeica* (Lindermayer, 1843)

Salicaria elaeica Lindermayer, 1843. Isis, von. Oken, col. 343 (Greece).

分布 国内见种的描述; 欧洲东南部, 从匈牙利南部到南斯拉夫, 希腊, 保加利亚, 罗马尼亚, 塞浦路斯, 小亚细亚, 远东, 外高加索, 伊拉克, 阿富汗, 塔吉克斯坦, 中亚, 越冬于埃塞俄比亚。

形态 详见种的描述。

生态 草绿篱莺栖息于多种多样的生境, 自农田、果园、公园、庭院、以及江、河、