

雄鸟颊部蓝色.....台湾亚种 *H. a. oberholseri*

(1) 华南亚种 *Hypothymis azurea styani* (Hartlaub, 1900)

Siphia styani Hartlaub, 1900. Abh. Nat. Ver. Bremen, 16(2): 248 (Hainan, China).

Monarcha azurea styani Ali & Ripley, 1972, 7: 223—224.

Hypothymis azurea styani Howard & Moore 1980: 483; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 372—373; Rothschild, 1926: 295; Cheng Tso-Hsin, 1987: 872; 1994: 153; Li Gui-Yuan *et al.*, 1993: 289; Wu Zhi-Kang *et al.*, 1986: 385; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 389; Yang Lan *et al.*, 2004: 678.

分布和形态 详见种的描述。

(2) 台湾亚种 *Hypothymis azurea oberholseri* Stresemann, 1913

Hypothymis azurea oberholseri Stresemann, 1913. Nov. Zool. 20: 295 (Taiwan, China).

分布 我国台湾。

形态 详见亚种检索表。

生态 性活泼,常来回飞翔于高大常绿阔叶林或竹丛间,在贵州海拔为 340—680 m。鸣声粗糙洪亮,连续不断。吴至康于 1977 年 4 月在贵州册亨剖检 3 胃,食物均为昆虫。Swinhoe 在台湾找到此鸟在竹林间以柳絮、杨花及蛛网等营深杯状的巢。巢中产卵 4—5 枚,卵呈白沾桃红色,并缀以鲜红色及淡粉红带灰色细点,特别在卵的钝端为多(引自 La Touche, 1925—1930: 177)。

XXV. 寿带属 *Terpsiphone* Gloger, 1827

Terpsiphone Gloger, 1827. in Froriep, Notizen 16: 278. **Type species:** *Muscicapa paradisi* Linnaeus.

形态 嘴形甚大,嘴基膨隆;嘴须多而粗长,头被冠羽,跗蹠很粗强;尾长而呈凸尾状,中央一对尾羽特形延长。

分布 世界上有 14 种,主要分布于非洲中南部、北部和亚洲大陆中南半岛及太平洋诸岛。其中见于我国的仅 2 种。

种 检 索 表

尾羽棕黄色或白色.....寿带[鸟] *T. paradisi*
尾羽黑色或褐色.....紫寿带[鸟] *T. atrocaudata*

131. 寿带[鸟] *Terpsiphone paradisi* (Linnaeus, 1758) (图 118, 图版 IV: 3)

别名 练鹄,三光鸟,紫带鸟,白带子(老雄),长尾巴练,绶带,一枝花(广东),紫长长尾(福州),长尾鷓