

虹膜淡褐色；嘴暗褐，下嘴基部黄色；脚淡黄色或肉色。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂	—	140	11	56—60	49—53	15.5
(Baker, 1924)						

分类讨论 本种全世界共有 4 亚种，我国仅分布有新疆亚种（中亚亚种）*L. n. straminea*。

(1) 新疆亚种 *Locustella naevia straminea* Seeböhm, 1881

Locustella straminea Seeböhm, 1881. Cat. Bds. Brit. Mus. 5: 117 (Turkestan, U.S.S.R.).

分布和形态 详见种的描述。

生态 栖息于林缘、河谷、水塘以及沼泽附近灌丛中。常单独在茂密的灌丛中活动，行动极为隐蔽。停栖于灌木或小树的顶端鸣叫，鸣声高而圆润，似远处传来的电钻声，有时长达 2 分钟。冬季时只发出短暂的“chip”声。食物为昆虫和其它小型无脊椎动物。

繁殖期 6—8 月。一般抵繁殖区不久雄鸟便开始占区鸣叫。营巢于柳灌丛、芦苇丛、杂草丛覆盖的地面上或灌、草丛中。巢呈杯状，由枯草茎、叶构成，内垫有细草茎，以及兽毛和鸟羽。巢大小为：外径 9—10 cm、内径 5 cm、高 8 cm。

每窝产 4—7 枚卵，通常 5—6 枚，卵呈白色或粉红白色，缀以小的粉红色斑点。卵的大小为 16—18.2 mm×12.5—14 mm。

雌鸟负责孵化，孵化期 13—15 天。雏鸟留巢期 10—13 天。

25. 矛斑蝗莺 *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840) (图 23)

别名 黑纹蝗莺

英文名 Lanceolated Grasshopper Warbler

Sylvia lanceolata Temminck, 1840. Man. Orn. 4: 614 (Mayence; error for Russia, ex Hartert).

Locustella lanceolata gigantea Johansen, 1954. Journ. Orn. 95: 92 (Shaweishan Is., Jiangsu, Eastern China).

Locustella lanceolata: Ali & Ripley, 1973, 8: 90; Howard & Moore, 1980: 441; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 51; Smythies, 1986: 328; Cheng Tso-Hsin, 1987: 783—784; 1994: 140; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 350; Yang Lan et al., 2004: 556.

分布 内蒙古（呼伦贝尔盟、哲里木盟、赤峰市）、黑龙江（哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、绥化、伊春、松花江、黑河、大兴安岭）、吉林（白城、吉林市、延边）、