

## 122. 斑鹟 *Muscicapa striata*(Pallas, 1764) (图 109)

英文名 Spotted Flycatcher

*Motacilla striata* Pallas, 1764. in Vroeg, Catal. Ois. Adumb: 3 (Netherlands).

**分布** 繁殖于新疆(西北部阿勒泰、西部喀什一带), 迁徙时经昆仑山; 贝加尔湖地区, 蒙古, 俄罗斯的乌拉尔, 地中海地区, 非洲北部, 小亚细亚, 高加索, 伊朗及喜马拉雅山脉西部, 并在印度西北部, 阿拉伯及非洲中部和南部越冬。

**鉴别特征** 上体大都灰褐色, 下体污白色, 胸部具暗灰褐色条纹。两性同型。

**形态(据 *M. s. neumanni* 亚种描述)**

**成鸟** 上体灰褐色; 前额和头顶浅黄白色, 而具黑褐色的细纹; 腰及尾上覆羽较背部稍多暗黄色; 尾羽暗褐色, 具狭窄淡棕色羽缘; 翅暗褐色; 初级飞羽具窄小的淡黄色羽缘, 次级飞羽及覆羽, 具淡黄色阔边; 眼先灰白色, 眼周淡黄白色; 耳羽淡褐色; 颊部各有浅褐色的条纹, 形成不甚明显的颊纹。下体大都白色; 胸部及两胁具淡褐色纵纹甚明显; 翅下覆羽乳黄白色; 尾下覆羽白色。雌雄两性羽色相似。

虹膜暗褐色; 嘴黑褐色; 脚暗褐色。

### 量衡度

| 性别    | 体重      | 全长        | 嘴峰 | 翅长      | 尾长      | 跗蹠        |
|-------|---------|-----------|----|---------|---------|-----------|
| ♂♂(4) | 16      | 149       | 16 | 86      | 63.7    | 16.4      |
|       | (15—18) | (135—160) | —  | (82—90) | (62—67) | (15.5—17) |

**亚种分化** 据 Vaurie(1959), 斑鹟有 7 亚种, 分布于我国境内只有 1 亚种。

### (1) 新疆亚种 *Muscicapa striata neumanni* Poche, 1904

*Muscicapa grisola neumanni* Poche, 1904. Orn. Monatsb. 12: 26, nom. nov. for:

*Muscicapa grisola sibirica* Neumann, 1900, Journ. Orn.: 259 (N. W. Massailand, Ukamba, Nguruman, Taweta, Kilimandsckaro, Africa); nec *M. sibirica* Gmelin, 1788.

**分布** 新疆(天山、阿勒泰及昆仑山一带)。

**形态** 见种的描述。

**生态** 此鸟见于阿尔泰山的杉木林中, 亦见于河谷的柳林及灌丛中, 通常单个或小群活动。性羞怯, 平时在树的低枝上停息, 极少在靠近树冠的枝条上, 见昆虫在附近飞过时, 常从栖木上突然出击。动作快速, 捕食后即返回原枝或附近另一树枝上; 它也常常降落到地上, 啄食地面上的昆虫。当它栖息时, 姿势笔直, 并将头靠在两肩之间, 尾羽不时地上下摆动, 双翅也随着轻轻拍动。它的食物主要是双翅目昆虫, 但也取食悬钩子浆果等。斑鹟在新疆为夏候鸟, 但至今尚无繁殖记载。