

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(5)	36.4 (34—41)	203.6 (198—209)	18.3 (18—19)	103.2 (101—105)	91.6 (90—93)	22 (21—23)
♀(1)	41	198	19	101	91	21
♂♂(5)	36.2 (32—38)	208.6 (197—225)	19.1 (17.5—20)	105.6 (99—111)	98 (90—107)	22 (21—24)
♀(1)	36	200	19	103	92	23

亚种分化 本科计有4亚种，主要产于中印半岛，在这4个亚种中，有2个亚种见于我国。

亚种检索表

- 头项辉钴蓝色..... 指名亚种 *N. g. grandis*
头项较淡，呈天蓝色..... 云南亚种 *N. g. griseiventris*

(1) 指名亚种 *Niltava grandis grandis* (Blyth, 1842)

Chaitaris grandis Blyth, 1842. Journ. As. Soc. Bengal, 11: 189 (Darjeeling, India).

Muscicapa grandis grandis Ali & Ripley, 1972, 7: 176—178.

Niltava grandis grandis Howard & Moore, 1980: 473; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 356; Rothschild, 1926: 296; Cheng Tso-Hsin, 1987: 855; 1994: 151; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 382; Yang Lan et al., 2004: 649.

分布与形态 均详见种的记述。

(2) 云南亚种 *Niltava grandis griseiventris* La Touche, 1921

Niltava grandis griseiventris La Touche, 1921. Bull. Brit. Orn. Cl. 42: 14 (Luoguzhai, southeastern Yunnan, China).

Niltava grandis griseiventris Mayr & Cottrell, 1986, 11: 356; Rothschild, 1926: 296. Cheng Tso-Hsin, 1987: 856; 1994: 151; Peng Yan-Chang et al., 1987: 382; Yang Lan et al., 2004: 650.

分布 云南东南部。

形态 见亚种检索表。