

我国境内有 3 亚种, 即指名亚种 *P. d. davisoni*、西南亚种 *P. d. disturbans* 和挂墩亚种 *P. d. ogilviegranti*。

亚种检索表

1. 上体橄榄绿..... 2
 上体较鲜绿, 中央冠纹和下体较黄; 侧冠纹暗橄榄褐色; 外侧尾羽白斑宽窄不一.....
 挂墩亚种 *P. d. ogilviegranti*
2. 下体沾黄, 并微具黄纹; 外侧尾羽白斑较宽(占内翎的全部或大部分)..... 指名亚种 *P. d. davisoni*
 下体较白; 外侧尾羽白斑较狭, 仅限于羽缘..... 西南亚种 *P. d. disturbans*

(1) 指名亚种 *Phylloscopus davisoni davisoni* (Oates, 1889)

Acanthopneuste divisoni Oates, 1889. Faun. Brit. Ind., Bds. 1: 420 (Mt. Moolcyit, Tenasseri, Burma).
Phylloscopus davisoni davisoni Howard & Moore, 1980: 446; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 248; Smythies, 1986: 341; Vaurie, 1959: 295—296; Cheng Tso-Hsin, 1987: 817; 1994: 145; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 362; Yang Lan *et al.*, 2004: 590.

分布 云南(贡山、腾冲、盈江、龙陵、潞西、凤庆、双江、永德、保山、永平、漾濞、丽江、澜沧、西双版纳)(留鸟); 部分冬季见于缅甸和中南半岛。

形态 详见亚种检索表。

(2) 西南亚种 *Phylloscopus davisoni disturbans* (La Touche, 1922)

Acanthopneuste trochiloides disturbans La Touche, 1922. Bull. Brit. Orn. Cl. 43: 22 (Mengzi, Yunnan, China).
Phylloscopus pseudus Stresemann, 1923. Orn. Monatsb. 31: 30 (Chengdu, Sichuan, China).

分布 重庆(秀山、南川)、四川(成都、康定)、贵州(绥阳、遵义、息烽、贵阳、龙里、望谟、江口、雷山、榕江)、云南(昆明、蒙自)、湖南(繁殖鸟)。为我国特有亚种。

形态 详见种的描述。

(3) 挂墩亚种 *Phylloscopus davisoni ogilviegranti* (La Touche, 1921)

Acanthopneuste trochiloides ogilviegranti La Touche, 1921. Bull. Brit. Orn. Cl. 42: 55 (Guadun, Fujian, China).

分布 福建(挂墩)(繁殖鸟); 越南北部。

形态 详见亚种检索表。

生态 白斑尾柳莺通常栖息于海拔 290—2200 m, 常三五只活动于常绿阔叶林的树冠顶部或林下灌丛中。性活泼, 行动敏捷, 不断地在枝叶间跳来跳去, 飞上飞下。只可