

**(2) 昌都亚种 *Phylloscopus fuligiventer tibetanus* Ticehurst, 1937**

*Phylloscopus tibetanus* Ticehurst, 1937. Bull. Brit. Orn. Cl. 57: 109 (Bombi (=Bimbi) La, Tsari, southern Tibet).

**分布** 西藏(则拉、朗县、纳木布、米拉、比母比和昌都地区)(繁殖鸟); 印度北部。

**形态** 详见亚种检索表。

**生态** 常单只或成对地栖息于海拔 3600—4300 m, 有时可达 5000 m 高原灌丛中, 或在大的乱石堆中来回走动, 寻觅食物。有时, 也到开阔地区寻觅食物。

冬季, 常出没于有水的地方, 自由地来回跳动着石块或水上浮木捕捉昆虫, 亦常见其飞到水面上捕捉昆虫。

鸣声是一种单调重复的“tsli-tsli-tsli…”声。有时几乎呈双音节的“tsuli-tsuli-tsuli…”声, 可重复五六次。叫声是“cht…cht…”声(约翰·马敬能等, 2000)。

主要食物是昆虫。

据 Baker(1924)记载: “1921 年 8 月 4 日在海拔 4593 m 处的西藏 Rhamtso 采得 1 只成鸟标本和一巢 3 枚卵。卵的大小为 15.0 mm×12.0 mm, 14.6 mm×12.2 mm 和 15.0 mm×12.0 mm”。

**52. 棕眉柳莺 *Phylloscopus armandii* (Milne-Edwards, 1865) (图 45)**

**别名** 柳串儿

**英文名** Buff browed Willow Warbler

*Abornis Armandii* Milne-Edwards, 1865. Bull. Nouv. Arch. Mus. Paris, 1: 22 (hills of western and northwestern Beijing, China, ex Ticehurst).

**分布** 内蒙古(东部赤峰、西部阿拉善盟)、辽宁(沈阳、鞍山)、陕西(秦岭山区)、北京、山西、甘肃(西北部和西南部)、青海(玉树)、贵州(西北部赤水、南部榕江)、四川(西部康定、北部松潘、西南部木里)、云南(西部腾冲、西北部丽江)、西藏(昌都地区北部和东南部)、湖北(西部)、青海(繁殖鸟)、越冬于云南南部; 冬季见于缅甸, 泰国, 老挝。

**鉴别特征** 上体为沾绿的橄榄褐色; 翅上无翼斑; 眉纹棕白色; 下体近白, 有少许黄色细纹。

**形态**(据采自四川巴塘的指名亚种 *P. a. armandii* 的雄性标本描述)

上体, 包括头顶、颈、背、腰和尾上覆羽概为沾绿的橄榄褐色。眉纹棕白色; 白眼先有一暗褐色贯眼纹伸至耳羽; 颊与耳羽棕褐色。飞羽和尾羽黑褐色, 具浅绿褐色羽缘。下体近白, 微沾以绿黄色细纹; 尾下覆羽淡黄皮色; 腋羽黄色。两性羽色相似。