

**亚种分化** 全世界有 7 亚种 (Howard *et* Moore, 1980; Mayr *et* Cottrell, 1986), 中国分布有 2 亚种。

### 亚种检索表

上体橄榄黄绿色, 腹部鲜亮黄色 ..... 云南亚种 *P. f. delacouri*  
 上体橄榄绿褐色, 腹部黄色较浅淡 ..... 华南亚种 *P. f. sonitans*

#### (1) 云南亚种 *Prinia flaviventris delacouri* Deignan, 1942

*Prinia flaviventris delacouri* Deignan, 1942. *Smiths. Misc. Coll.* 103(3): 8—9 (Chiang Mai, northern Thailand).

*Prinia flaviventris delacouri* Howard & Moore, 1980: 455; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 141; Cheng Tso-Hsin, 1987: 839; 1994: 149. Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 371; Yang Lan *et al.*, 2004: 622.

**分布** 云南(腾冲、盈江、耿马、思茅、西双版纳)(留鸟); 缅甸东南部, 泰国(北部和中部)。

**形态和量衡度** 见种的记述。

#### (2) 华南亚种 *Prinia flaviventris sonitans* Swinhoe, 1860

*Prinia sonitans* Swinhoe, 1860. *Ibis*, 2: 50 (Xiamen, Fujian, China).

*Prinia flaviventris sonitans* Howard & Moore, 1980: 455; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 141; La Touch, 1926, 3: 272—273; Cheng Tso-Hsin, 1987: 839; 1994: 149; Yang Lan *et al.*, 2004: 622.

**分布** 云南(东南部绿春)、贵州(东南部榕江、从江)、广西(西南部金秀、靖西、那坡、龙州、邕宁、上思)、广东(英德、清远、大甫、海丰、潮安、山水、高要、徐闻、海南)、浙江(宁波、温州、龙泉)、福建(东部和西北部)、台湾(留鸟); 越南东北部。

**形态** (依 5 月采自云南东南部绿春的标本描述)

**成鸟 夏羽:** 前额至头顶和头侧暗石板灰色, 后颈、颈侧、背至腰和肩羽橄榄绿褐色, 翅上覆羽和飞羽暗褐色, 外缘黄褐色; 颊和颞、喉至上胸近白色, 下胸和腹部淡黄色; 胸侧、胁部及尾下覆羽皮黄色; 覆腿羽浅棕黄色; 尾羽暗黄褐色, 边缘较浅淡, 隐现暗褐色纤细横纹。

虹膜橙黄色; 嘴黑色; 跗蹠、趾和爪黄褐色。

#### 量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(4)*	7.0—8.5	123—135	10.5—12	43.0—44.8	67.5	20.3—21.3
♂(1)**	7	114	11	41	58	21
♀(1)***	6	143	11	47	75	21

\* 据吴至康等(1986); \*\* 据诸葛阳等(1990); \*\*\* 据云南东南部绿春标本。