

供观赏的稀有鸟。

XXVI. 扇尾鹟属 *Rhipidura* Vigors et Horsfield, 1826

Rhipidura Vigors & Horsfield, 1826. Trans. Linn. Soc. London, 15(1): 246. **Type species:** *Muscicapa flabellifera* Gmelin.

Chelidorhynchus Blyth, 1843. Jour. Asiat. Soc. Bengal, 12: 930, 936 foot-note, **Type species:** *Rhipidura hypoxantha* Blyth.

形态 嘴形大，长度较嘴基的宽度约达2倍；嘴须多而长；尾较翅长，呈凸尾状；展开若扇状，幼鸟不具点斑，但羽缘沾棕。

分布 全世界有37种(Mayr et Cottrell, 1986)，我国有3种。主要分布于太平洋诸岛、中南半岛、印度半岛和中国西南部热带和亚热带地区的森林中。

种 检 索 表

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. 下体黄色 | 黄腹扇尾鹟 <i>R. hypoxantha</i> |
| 下体非黄色 | 2 |
| 2. 白眉纹宽阔成带状，胸和腹均白色 | 白眉扇尾鹟 <i>R. aureola</i> |
| 白眉纹甚细，喉白色；下体余部淡灰褐色 | 白喉扇尾鹟 <i>R. albicollis</i> |

133. 白眉扇尾鹟 *Rhipidura aureola* Lesson, 1831

别名 缅甸扇尾鹟(鸟类目录试编)

英文名 White-browed Fantail Flycatcher

Rhipidura aureola Lesson, 1831. Traité Orn.: 290 ("New Holland" = ? Bangladesh).

分布 云南西部腾冲(郑作新, 1987)、盈江蚌西(Ponsee)(Rothschild, 1926)；印度，孟加拉国，缅甸，泰国，斯里兰卡。

鉴别特征 额和眉纹具白色宽带；头顶和背部烟灰色；喉部黑色；胸和腹部白色；中央2对尾羽淡黑色。

形态

雄性成鸟 额及宽阔眉纹白色，非常显著；头的前部黑色，向后转为黑褐色，背及两翅均微沾灰，翼上覆羽均具白端；尾羽暗褐而端白，白端从中央尾羽向外侧逐渐扩大。下体白色，颏和喉部混有灰黑点斑。两性羽色近似，雌性成鸟比雄鸟较淡些。

量衡度

翅长 77—86 mm(据 Baker, 1924)。

亚种分化 本种全世界有3亚种(Mayr et Cottrell, 1986)，我国只偶见其一，仅记录于云南西部(郑作新, 1987)。

(1) 云南亚种 *Rhipidura aureola burmanica* (Hume, 1881)

Leucocerca burmanica Hume, 1881. Str. Feath. 9: 175 (Thungyccn Valley, Tenasserim, Burma).

Rhipidura aureola burmanica Ali & Ripley, 1972, 7: 210; Howard & Moore, 1980: 490; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 536; Rothschild, 1926: 297. Cheng Tso-Hsin, 1987: 875; 1994: 154; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 391; Yang Lan *et al.*, 2004: 683.

分布和形态 见种的描述。

生态 性活泼，栖息于低落干燥树林中，或开阔的灌木园地。国内食性及营巢的情况不明。

134. 白喉扇尾鹟 *Rhipidura albicollis* (Vieillot, 1818) (图 120)

别名 白喉扇尾山鸟(鸟类目录试编)

英文名 White-throated Fantail Flycatcher

Platyrhynchus albicolles Vieillot, 1818. Nouv. Dict. Hist. Nat. 27: 13 (Bangladesh).

分布 西藏(南部偏东地区、吕都地区西南部)、重庆万州、四川西南部、贵州(南部册亨、罗甸)、云南全境、广西瑶山、广东、海南、香港(留鸟); 尼泊尔, 印度, 东南亚, 南抵苏门答腊, 加里曼丹, 爪哇。

鉴别特征 全身大都暗灰褐色; 颏和喉白色显著。

形态 雌雄同色。全身几乎全部略带褐灰黑色; 额和头顶近黑色; 眉纹白色, 但甚细短, 远不如白眉扇尾鹟之粗长。颏和喉均白色, 延伸至颈侧而成颈环状, 非常明显夺目。翼上覆羽无白端, 尾羽黑褐色, 除中央尾羽外, 两侧尾羽均有白色端斑。

虹膜钴褐色; 嘴、脚及趾均黑色。

量衡度(引自云南鸟类志)

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(42)	11.2	177	9.9	77.6	104	19.1
	(9—15)	(156—197)	(9—11)	(70—83)	(97—113)	(18—20)
♀♀(19)	10.9	177.4	9.7	74.6	100	18.8
	(7—14)	(162—188)	(9—11)	(71—80)	(91—105)	(17—20)
♂♀(14)	11.1	176.5	9.5	74.4	100	18.3
	(9—15)	(154—191)	(9—10)	(71—78)	(92—105)	(18—19)

分类讨论 本种有 10 多个亚种, 但许多迄未确立。例如, Riley 等所提的 *R. a. celsa* 和 *R. a. nigritinctus* 等亚种, 因种群数量不多, 现暂且都归隶于指名亚种 *R. a. albicollis*。只得今后查看更多标本时, 才能肯定确立。