

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(12)	7.3 (7—8)	110.2 (100—124)	9.5 (8—12)	54.3 (48—60)	47.3 (41—56)	17.9 (16—20)
♀♀(7)	7.1 (7—9)	109 (95—120)	10.1 (9—11)	55.1 (52—57)	46.8 (40—49)	18.1 (17—20)
♂♂(4)	7, 7 8, 10	109, 115 118, 120	8, 9 10, 11	51, 56 56, 59	42, 47 49, 52	17, 18 18, 20

亚种分化 全世界分化为5亚种(Mayr et Cottrell, 1986), 中国记录4亚种。

亚种检索表

- 上体淡绿, 冠纹和头侧淡绿色, 几乎无灰彩, 侧冠纹黑色 指名亚种 *S. b. burkii*
上体橄榄绿, 中央冠纹烟灰或多少沾橄榄绿色 2
- 中央冠纹纯烟灰色, 侧冠纹深黑色, 较粗著, 上体多显金黄色光彩 西南亚种 *S. b. distinctus*
中央冠纹灰而多少沾橄榄绿色, 侧冠纹乌黑而较细狭, 上体少金黄色光彩 3
- 中央冠纹橄榄灰, 而多显绿色 云南亚种 *S. b. tephrocephalus*
中央冠纹灰, 沾橄榄绿色, 而多显灰色 华南亚种 *S. b. valentini*

(1) 指名亚种 *Seicercus burkii burkii* (Burton, 1835)

Sylvia burkii Burton, 1835. Proc. Comm. Sci. Corr. Zool. Soc. London, 3: 153 (Himalayas).

分布 西藏(波密易贡、樟木曲香、拉龙、匹马阔村、利素木、尼油山口、帕苏姆错、金嘎、狄里派、加拉、西藏南部、昌都地区西南部); 尼泊尔, 不丹, 印度(北部、大吉岭、阿萨姆山地), 冬季南迁至孟加拉国的吉大港等地。

形态 参见亚种检索表。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(4)	7—8	102—115	9—10	56—61	47—55	19—20

(2) 云南亚种 *Seicercus burkii tephrocephalus* (Anderson, 1871)

Culicipeta tephrocephalus Anderson, 1871. Proc. Zool. Soc. London: 213 (Bhamo, Burma).

Seicercus burkii tephrocephalus Ali & Ripley, 1973, 8: 184; Howard & Moore, 1980: 447; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 257; Smythies, 1986: 342; Vaurie, 1959: 297; Cheng Tso-Hsin, 1987: 822; 1994: 146; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 364.

分布 云南[贡山独龙江、碧罗雪山、香格里拉、丽江鲁甸、剑川、永德、龙陵小黑山等地(繁殖鸟)、潞西、澜沧、景洪、勐腊、屏边、金平、绿春、昆明等地(旅鸟、冬候鸟)]; 缅甸北部山地, 迁至孟加拉国南部和缅甸南部的德林达依北部, 泰国北部及周边其它地区越冬。

形态 与量衡度见种的描述。

(3) 西南亚种 *Seicercus burkii distinctus* (La Touche, 1922)

Cryptolopha burkii distincta La Touche, 1922. Bull. Brit. Orn. Cl. 43: 41 (Mengzi, Yunnan, China).

Seicercus burkii distinctus Howard & Moore, 1980: 447; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 258; Vaurie, 1959: 297; Cheng Tso-Hsin, 1987: 822; 1994: 146; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 365.

分布 西藏(察隅)、甘肃(文县、舟曲、天水、武山)、陕西(南部)、重庆(城口、南川)、四川(南充、万源、屏山、乐山、峨眉、甘洛、美姑、雷波、马边、雅安、天全、宝兴、西昌、会东、木里)、贵州(印江、江口、都匀、罗甸)、云南(贡山、腾冲、凤庆、永德、潞西、景东、昆明、石屏、屏边、景洪)、广西西北部等地(繁殖鸟), 广东(冬候鸟), 北京(迷鸟); 越南北部, 南迁至泰国北部和越南南部越冬。

形态 该亚种头顶中央冠纹纯暗灰色, 一般较宽阔, 侧冠纹深黑色亦较粗著; 耳后枕侧染灰色; 上体辉橄榄绿, 较多显金黄绿色光彩。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂♂(8)	6.9 (5—9)	110.5 (100—125)	9.5 (9—10)	54 (48—60)	45.1 (41—49)	17.4 (17—19)
♀♀(4)	6.5, 6.5 7, 9	95, 95 99, 111	8, 9 10, 10	45, 46 47, 52	33, 40 40, 45	16, 17 18, 20
♂♂(4)	7, 7 8, 8	103, 109 112, 120	8, 8 9, 9	45, 48 50, 53	39, 40 41, 44	15, 17 18, 21

(4) 华南亚种 *Seicercus burkii valentini* (Hartert, 1907)

Cryptolopha burkii valentini Hartert, 1907. Vög. pal. Fauna. 1: 497 (Taibai Mt., Qinling Range, Shaanxi, China).

Seicercus burkii latouchei Bangs, 1929. Proc. New Engl. Zool. Cl. 11: 4 (Guadun, Fujian, China).

Seicercus omeiensis Martens et al., 1999. Zoologische Abhandlungen, 50(18): 281—326 (Emei Shan, Sichuan, China).

Seicercus burkii valentini Howard & Moore, 1980: 447; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 258; Vaurie, 1959: 298; Cheng Tso-Hsin, 1987: 823; 1994: 146; Peng Yan-Zhang et al., 1987: 365.