

2. 栗型鸟背部暗栗色; 腹纯白色; 尾下覆羽沾棕; 无白型雄鸟……………滇南亚种 *T. p. indochinensis*
 栗型鸟背部红橄榄褐色; 腹部皮黄色; 尾下覆羽淡栗色; 白型雄鸟较常见, 占全部雄鸟的 80%……………
 ………………滇西亚种 *T. p. saturator*

(1) 普通亚种 *Terpsiphone paradisi incei* (Gould, 1852)

Muscipeta Incei Gould, 1852. Bds. As. 2 : pl. 19 and note (Shanghai, China).

Terpsiphone incei Rothschild, 1926: 291.

Terpsiphone paradisi incei Howard & Moore, 1980: 482; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 386; Vaurie, 1959: 315; Cheng Tso-Hsin *et al.*, 1973: 206; Cheng Tso-Hsin, 1987: 873; 1994: 154; Wang Xiang-Ting, 1991: 837; Ma Jian-Zhang *et al.*, 1992: 194—295; Cai Qi-Kan, 1987: 495; Zhu Ge-Yang *et al.*, 1990: 400—402; Li Gui-Yuan *et al.*, 1985: 286—287; Wu Zhi-Kang *et al.*, 1986: 385—387; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 390; Yang Lan *et al.*, 2004: 681.

分布 自东北中部哈尔滨和长白山、南部营口和丹东、西南部朝阳以及河北、西达陕西南部、甘肃西北部及南部武山、四川雅安和峨眉山、南至云南、贵州、广西、广东(夏候鸟、旅鸟)。

形态 详见亚种检索表。

(2) 滇南亚种 *Terpsiphone paradisi indochinensis* (Salomonsen, 1933)

Tchitrea affinis indochinensis Salomonsen, 1933. Ibis: 734 (Angkor, Cambodia).

Terpsiphone paradisi indochinensis Howard & Moore, 1980: 482; Deignen, 1945: 464—465; Cheng Tso-Hsin, 1987: 873; 1994: 154; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 390; Yang Lan *et al.*, 2004: 680.

分布 云南(西部、南部西双版纳及东南部)(夏候鸟)、贵州(册亨和望漠)(旅鸟、繁殖鸟); 泰国, 缅甸和柬埔寨。

形态 与普通亚种 *T. p. incei* 比较, 喉为灰色而非黑色。与滇西亚种 *T. p. saturator* 比较, 背部暗栗色; 腹纯白色; 尾下覆羽沾棕; 无白型雄鸟。

(3) 滇西亚种 *Terpsiphone paradisi saturator* (Salomonsen, 1933)

Tchitrea affinis saturator Salomonsen, 1933. Ibis, (13) 3 : 732 (Buxa Duars, Bhutan).

Terpsiphone paradisi affinis Rothschild, 1926: 291.

Terpsiphone paradisi saturator Ali & Ripley, 1972, 7: 221—222; Howard & Moore, 1980: 482; Mayr & Cottrell, 1986, 11: 386; Vaurie, 1959: 315; Cheng Tso-Hsin, 1987: 873; 1994: 153—154; Peng Yan-Zhang *et al.*, 1987: 390; Yang Lan *et al.*, 2004: 680.

分布 云南(西部腾冲、盈江、潞西、永德、耿马)(夏候鸟); 喜马拉雅山东部, 印度阿萨姆邦和孟加拉国。

形态 与普通亚种 *T. p. incei* 比较喉为灰色而非黑色。与滇南亚种比较, 背部红橄