

达嘴的尖端；前额至头顶栗红色，头侧灰色，眉纹呈淡灰色；上体余部橄榄绿色，腰沾黄色。颈、喉和胸暗灰色，腹部辉亮黄色；外侧两对尾羽内翮白色。两性羽色相似。与栗头鹟的区别在于头顶无黑色侧冠纹及无黄色翼斑。

形态 (据采自云南东南部金平的 *T. h. tonkinensis* 亚种描记)

雄性成鸟 前额至头顶栗红色；后颈、背、肩羽和翅上覆羽、尾上覆羽均呈暗橄榄绿色，腰沾黄；飞羽和尾羽暗褐色，外缘亦暗橄榄绿色，外侧两对尾羽内翮白色；眼先、眉纹、颊部和耳羽及颈侧苍灰色，斑杂灰黑色细小斑纹。颈淡灰白色，喉至上胸灰白色，斑杂灰黑色；下胸、腹部至尾下覆羽及胁部鲜黄色；腋羽和翅下覆羽淡黄色。

虹膜暗褐色；上嘴暗褐色，下嘴淡褐色，基部黄色；跗蹠黄褐色。

量衡度

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♂(1)	6	102	11	47	48	22

亚种分化 全世界分化为 2 亚种 (Mayr *et* Cottrell, 1986)。依万诺夫 (1959) 和郑作新 (1976, 1987) 记录在中国云南东南部金平分布有宽嘴鹟，并未列出亚种。郑作新 (1994) 将其列为 *T. h. tonkimensis* 亚种。约翰·马敬能等 (2000) 记述指名亚种见于西藏东南部。Delacour 和 Jabouille (1931) 记述 *T. h. tonkinensis* 亚种的羽色较指名亚种更深浓。

亚种检索表

羽色较深浓	滇南亚种 <i>T. h. tonkinensis</i>
羽色较浅淡	指名亚种 <i>T. h. hodgsoni</i>

(1) 指名亚种 *Tickellia hodgsoni hodgsoni* (Horsfield *et* Moore, 1854)

Abrornis hodgsoni Horsfield & Moore, 1854. Cat. Bds Mus. E. Ind. Co. 1: 412 (India).

分布 西藏东南部；尼泊尔，印度（北部、东北部大吉岭、那加兰邦、曼尼普尔邦？），缅甸西部。

形态 与滇南亚种相似，仅羽色较为浅淡。

量衡度 (Ali *et* Ripley, 1973)

性别	体重	全长	嘴峰	翅长	尾长	跗蹠
♀	—	—	12—14	45—49	38—45	20—21

(2) 滇南亚种 *Tickellia hodgsoni tonkinensis* (Delacour *et* Jabouille, 1930)

Abrornis hodgsoni tonkinensis Delacour & Jabouille, 1930. Oiseau, 11: 396 (Shaba, northern Vietnam).
Abroscopus hodgsoni: Ali & Ripley, 1973, 8: 195; Howard & Moore, 1980: 448; Delacour & Jabouille,