

玫瑰红色，但变化较大；小、中和大覆羽沙褐色；小翼羽和初级覆羽黑褐色；翼和尾羽褐色，羽缘近白色，外侧尾羽的白色羽缘较宽；下体皮黄色；腹及尾下覆羽色淡而近白，胸和两胁及上腹贯以褐至灰褐色的羽干纹；翼下覆羽和腋羽均白色。

雌性成鸟：羽色大致似雄鸟，但腰部淡皮黄色而近白色，并有淡褐色纵纹。

虹膜褐色；嘴象牙黄或灰黄色，脚灰黑色。

量衡度：（据钱燕文等，1965）：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	12	125	9.5	73	60	15
♀ (1)	11	120	8	72	60	15.5

亚种分化 黄嘴朱顶雀共分 8 个亚种；现将分布于我国的 4 个亚种检索于下：

- 1 体色最淡 2
- 体色最暗 3
- 2 上体灰棕色；背与胸的黑褐色纵纹均较淡、细；腹白 南疆亚种 *C. f. montanella*
- 上体较多棕色；背与胸的纵纹较浓褐，而形亦较粗；腹白 北疆亚种 *C. f. korejevi*
- 3 嘴形较细，嘴基宽 4.8mm；翅长（12♂♂）75.2（72.0—77.5）mm 青海亚种 *C. f. miniakensis* (111)
- 嘴形较粗，嘴基宽 5.3mm；翅长（12♂♂）79.7（77—85）mm 藏南亚种 *C. f. rufostrigata* (111)

(1) 南疆亚种 *Carduelis flavirostris montanella* (Henderson et Hume)

分布于新疆天山南坡、喀什、乌鲁木齐市、莎车、皮山、阿克陶、塔什库尔干和阿尔金山一带（留鸟）。国外见于伊朗，帕米尔，克什米尔到印度。

形态详见种的描述。

Linora montanella Henderson et Hume 1873, Lakore to yarkand: 261 (模式产地：新疆莎车)。

Carduelis flavirostris pallescens Судиповская, 1938, Докл. Акад, Наук 1: 119 (模式产地：新疆喀什市)。

(2) 北疆亚种 *Carduelis flavirostris korejevi* (Sarudny et Härms)

分布于新疆准噶尔、吐鲁番、和静、阿克苏、喀什、阿克陶（繁殖鸟）。国外见于俄罗斯和伊朗。

体色与南疆亚种相似，但较暗红褐，上下体的纵纹更浓和粗大，翅及尾羽的羽缘更白而宽。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (3)	14,14,15	140,140.4,141	8.6,9.1,9.5	73,76,78	60,65,65.5	14.5,15,15

Linota brevirostris korejevi (Sarudny et Härms), 1914, Orn. Monat 22: 53. (模式产地：Semiretchie)