

枚的羽缘近白色；下体余部粉红色；翼下覆羽和腋羽淡灰而沾红。

雌性成鸟：上体从头至短的尾上覆羽，包括肩羽和小、中覆羽黄褐色，具暗色纵纹；长的尾上覆羽和尾羽褐色，外侧一对尾羽具窄的白边，其他尾羽具淡褐色狭边；飞羽黑褐色，具淡灰色羽缘；下体淡灰沾黄，具少量窄的褐色羽干纹。

虹膜暗褐色；嘴黄褐色；脚黑褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (15)	44.4 (38—45)	195.5 (180—205)	13.4 (12—15)	118.0 (111—130)	88.8 (87—95)	23.7 (21—26.9)
♀♀ (12)	46.5 (38—52)	188.5 (178—196)	13.9 (13—15)	113.3 (108—118)	87.4 (81.5—94)	23.3 (21—25)

亚种分化 大朱雀有4个亚种，有2个见于我国，现检索于下：

- 体形较小，雄鸟翅长106—112mm 新疆亚种 *C. r. kobdensis*
体形较大，雄鸟翅长111—130mm 青藏亚种 *C. r. severtzovi*

(1) 新疆亚种 *Carpodacus rubicilla kobdensis* (Sushkin)

分布于我国新疆吐鲁番与和静（繁殖鸟）。国外分布于俄罗斯南部和蒙古。

雄性成鸟 与青藏亚种很相似，但羽色较浓；颊部及耳羽浓粉红色；头顶、喉及胸深洋红色；尾羽较黑，外侧尾羽白色羽缘极窄；飞羽黑褐，具白色狭缘。

雌性成鸟 上体由头至短的尾上覆羽灰褐色，具暗褐色纵纹；长的尾上覆羽及尾羽淡黑褐色，外侧一对尾羽的白色羽缘较宽；飞羽暗褐，具淡褐至近白色羽缘；下体浓棕黄，具褐色羽干纹；胸及胁各羽中央沾灰褐色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	39—44	176—200	14—15.5	106—112	81—92	20.5—24
♀♀ (4)	42、44.5 42、46	167、173 180、197	14、14.2 15.5、16.4	100、101 107、110	75、77 89、95	21.4、21.5 21.5、21.5

Erythrina rubicilla kobdensis Sushkin 1925, proc. Boston Soc. Nat. Hist., 38, no, 1, p. 13 (模式产地：蒙古西北)。

Erythrina rubicilla altaicus Dementiev 1934, Loiseau, p. 285.

(2) 青藏亚种 *Carpodacus rubicilla severtzovi* Sharpe

分布于新疆阿克苏、乌什、喀什、皮山、于田、天山和喀喇昆仑山，甘肃，祁连山，青海，西藏昌都、札达、普兰和噶尔县等。

形态详见种的描述。

Carpodacus severtzovi Sharpe 1886, proc. Zool. Soc. London: 354 (模式产地：新疆莎车)。