

Emberiza fucata Pallas, 1776, Reis. Versch. Prov. Russ. Reichs 3: 237 (模式产地: Sideni).

(2) 西南亚种 *Emberiza fucata arcuata* Sharpe

分布于宁夏泾源, 陕西秦岭, 四川屏山、雅安及西南部, 云南西北部、丽江、永仁和南部元江、贡山县, 贵州兴义县和安龙。国外见于阿富汗, 巴基斯坦, 克什米尔, 印度, 尼泊尔, 锡金, 缅甸。

雄性成鸟: 头顶灰色暗浓, 黑纹较密而显著; 背部栗色深浓, 黑纹较细; 耳羽栗色暗浓; 喉侧黑斑在上胸连接起来; 胸部栗色横带较宽; 两胁深栗色较浓, 扩在腹面。

雌性成鸟: 与雄近似, 但羽色较暗。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (5)	17—19	141—149	11—12	66—69	57—60	21—23
♀♀ (2)	17, 20	145, 147	11, 11	65, 66	56, 57	21.5, 21

Emberiza arcuata Sharpe, 1888, Vat. Brist. Mus. 12: 494 (模式产地: 喜马拉雅山脉)。

(3) 挂墩亚种 *Emberiza fucata kuatunensis* La Touche

分布于长江下游, 福建西北部, 云南东南部 (繁殖鸟、留鸟); 福建与广东平原一带 (冬候鸟)。

雄性成鸟: 头暗灰色; 翕栗色; 翼覆羽和背后部鲜栗色; 下体与指名亚种相似, 两胁栗色沾黄, 具暗绿色和暗褐色条纹。个别标本的外侧肩羽微有点斑。

雌性成鸟: 与雄相似, 但羽色甚暗; 头部灰色少, 头顶褐色, 具黑色纵纹。

量度: (据 La Touche, 1925—1930)

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	—	11.5, 13	69.5, 71.5	61, 62	20, 20.5
♀♀ (2)	—	11.5, 12.5	68, 71.5	58, 61.5	20, 20.5

Emberiza fucata kuatunensis La Touche, 1925, Bull. Brit. Orn. Cl. 46: 23 (模式产地: 福建挂墩)。

Emberiza fucata fluviatilis La Touche, 1925, Ibis, 46: 23 (模式产地: 江苏镇江)。

生态 赤胸鹀是开阔地区露天景观的鹀类, 喜栖于低山区或半山区的河谷沿岸草甸, 森林迹地形成的湿草甸或草甸加杂稀疏的灌丛, 而不深入于高山郁林间。在迁徙途中和越冬地多在平原低地的荆棘、小树或高草上活动, 同时也到村边、苗圃和农田中。繁殖期成对生活, 迁徙时结群飞行, 并常和其他鹀类混群, 但在越冬地多分散地单个活动, 尤以田地垅沟中较多, 不易发现。性不大怯疑, 除非极其接近时才飞离。在地上或草丛与灌丛中觅食。食物随季节和地区而异: 春季以各种杂草子为主; 繁殖期以昆虫及其幼虫、蠕虫及水生动物最多; 秋季食物多次见有小米、高粱等谷物; 冬季而以树木种子和草子