

鸟)。

雄鸟：嘴基周围、眼先及颊等均近黑色、头的余部、颈、颞、喉及胸部橄榄绿色；肩、背棕褐，具黑色条纹，腰及尾上覆羽淡橄榄褐；两翼黑褐，覆羽具棕白色羽端，飞羽外缘棕褐；尾羽黑褐，外侧两对尾羽有白色楔状斑；腹及尾下覆羽辉黄，两胁具黑褐色纵纹。

雌鸟：头顶转褐，与背均具黑褐色纵纹，眉纹及颞纹土黄色；胸、腹淡绿黄，胸和体侧均杂以黑褐色纵纹。

幼鸟：似雌鸟，但纵纹更多，下体黄色较淡。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	17.9	135.5	11.1	70.9	63.4	19.9
	(16—19)	(127—145)	(10—12)	(68—73)	(61—66)	(19—21)
♀♀ (10)	19.5	135.1	10.4	68.2	57.4	20.2
	(19—20)	(128—142)	(9.5—11)	(64—73)	(55.5—62.5)	(19.5—21.5)

*Emberiza sordida* Blyth, 1844, Journ. As. Soc. Bengal 13: 958 (模式产地：尼泊尔)。

*Emberiza melanops* Blyth, 1845, J. As. Soc. Bengal 14: 554 (模式产地：孟加拉国)。

### (3) 日本亚种 *Emberiza spodocephala personata* Temminck

国内见于东南沿海的江苏沙卫山岛、浙江、广西大青山、广东(迷鸟)。在国外，为日本特有亚种，分布于千岛群岛、琉球群岛，俄罗斯萨哈林岛(库页岛)，越冬在缅甸，不丹及尼泊尔等地。

雄鸟：色泽与东北亚种相似，其区别在于头部绿色较著，肩和背部条纹较宽，喉和胸黄色，最外侧一对尾羽白色部分较少，仅在内翮中部呈较狭的楔形，而次外侧一对尾羽内翮末端的白色仅成一白色点斑。下体鲜黄色。

雌鸟：和雄鸟相似，区别在于头顶、喉及胸具点斑，肩和背部纵纹浓著，胸部横一金褐色带。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ (1)	21.6	160	11	74	64	19.5
♀ (1)	21	152	9.7	67.8	66.5	19.4

*Emberiza personata* Temminck, 1835, in Temminck and Laugier Planches Color., 98, Pl. 580

(模式产地：日本北部)。

**生态** 灰头鹀栖息在平原以至高山，可见于海拔3000m左右。生活于山区河谷溪流两岸，平原沼泽地的疏林和灌丛中，也在山边杂林、草甸灌丛、山间耕地以及公园、苗圃和篱芭上。

常成小群活动，除繁殖期成对外，也有单独活动者，性不怯疑，容易使人接近往往