

腹侧和两胁微带焦黄色。

雄性幼鸟：翼和尾羽与雄鸟同色，但黑色较暗。

雌性幼鸟：大体与雌性成鸟相似，但上体色泽较浅，从头至腰均呈浅灰色；喉和腹部近白色；腹侧和两胁无焦黄色。

虹膜浅红褐色；嘴橙黄色，在繁殖期嘴基、会合线和尖端呈蓝黑色；脚肉色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (10)	50.0	187.0	19.3	98.0	77.5	21.5
	(45—55)	(176—198)	(18—20.5)	(95—101)	(76—84)	(20—23)
♀♀ (8)	42—45	174—190	17—20	93—99	68—78	20—23

亚种分化 本种共有 2 个亚种，均见于我国。现检索于下：

上下体均较暗，体型也较大；翅长 5♂♂ 101.4(99—104.3)mm；嘴较大，长达 21.3 (20—22.9) mm
 长江亚种 *E. m. sowerbyi*

上下体较淡，体型也较小；翅较短 10♂♂ 98.0 (95—101) mm；嘴较小，为 19.3 (18—20.5) mm
 指名亚种 *E. m. migratoria*

(1) 指名亚种 *Eophona migratoria migratoria* Hartert

国内分布于黑龙江北部黑河，吉林长白山，辽宁草河口、朝阳，内蒙古北部扎兰屯、东南部赤峰，河北东北部和中部（繁殖鸟）；河北南部，陕西，山东，河南，安徽，浙江，湖南，云南西北部，贵州（旅鸟）；福建，台湾，广东，广西（冬候鸟）。国外见于西伯利亚东南部，日本和朝鲜半岛等地。

形态详见种的描述。

Eophona melanura migratoria Hartert 1910, Vög. Bal. Faun. 1: 59 (模式产地: Sidemi).

(2) 长江亚种 *Eophona migratoria sowerbyi* Riley

仅分布于我国长江流域自四川重庆、峨眉、成都、雅安、湖北以至江苏镇江，上海，云南西部腾冲和贵州遵义。

雄鸟：头辉黑，后颈和上背、肩及内侧翼覆羽灰褐色；下背至腰灰色，前者微沾褐；尾上覆羽灰白色；尾羽黑色，中央尾羽和最外侧尾羽的缘带绿色金属光泽；翅黑色，具暗绿蓝金属光泽；翼覆羽尖端和前 5 枚初级飞羽的尖端白色，形成白斑；颈侧和胸灰色；两胁焦黄；腹和尾下覆羽白色。

雌鸟：额和头顶灰色，微沾褐；眼先和嘴基四周污褐色；上体余部浅褐灰色，腰和尾上覆羽淡灰色，中央尾羽和其次尾羽外翮灰色，两翅与雄鸟同色但白色少而狭，下体灰色，沾褐，胸部较淡；两胁色同雄鸟。