

腹部更淡。

虹膜褐色；嘴黑色（春、夏季）或黄色（冬季），3、4月间又变黑；脚和爪黑色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	26—28	161—165	11—12	110—115	72—74	20—21
♀♀ (6)	26—29	142—164	11—12	97—102	62—73	19—21

亚种分化 全世界共有 14 个亚种，我国仅有 2 个亚种，现检索于下：

翼羽无玫瑰色羽缘 指名亚种 *L. a. arctoa*
 翼羽有玫瑰色羽缘 东北亚种 *L. a. brunneonucha*

(1) 指名亚种 *Leucosticte arctoa arctoa* Pallas

国内见于新疆阿勒泰（旅鸟？繁殖鸟）。国外分布于阿尔泰山，冬季见于西伯利亚和蒙古西北部。

雄性成鸟额淡紫红色，后颈浅灰白色；上体几乎黑色，尾上覆羽和尾羽及大部分飞羽概灰白色；下体玫瑰红色彩较东北亚种浅淡而稀少。

雌性成鸟体色与雄鸟相似，但是一般色泽较淡。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (2)	28,30	170,175	10.5,11	110,115	73,75	21.5,22

Passer arctous Pallas 1811, Zool. Rosso-Asiat. 2: 21 (模式产地：西伯利亚)。

(2) 东北亚种 *Leucosticte arctoa brunneonucha* (Brandt)

国内见于东北西北部满洲里、中部哈尔滨、东南部长白山，内蒙古东部和河北小五台。国外分布于西伯利亚至堪察加半岛、千岛群岛，冬季至乌苏里和日本。

形态详见种的描述。

Fringilla pultulata Lichtinstai 1818, verz. aus. Säug: 24 (模式产地：千岛群岛)。

Fringilla (Linaria) *brunneonuch* Brandt 1842, Bull. Acad. Imp. Sei. St. Peterbarg 10, 152

(模式产地：堪察加)。

生态 粉红腹岭雀属高山鸟类，栖息于海拔 2700m 以上的高山岩壁、石砾堆、高山盆地、丛林高地、沿海砂地港口及灌木丛中，冬季垂直迁到山谷中越冬，部分个体进行游荡。一般多为 20—30 只结群活动。性颇怯疑，飞行迅速。叫声是单一的“chew”或“cheew”的重复，也有嘶哑的和像麻雀的尖锐的“chirp”声；歌声是由慢慢下降的“chew”音的连续旋律构成，此歌声或是从地上或是在环形和波状飞翔时发出。食物以野生植物的种子为主，兼食昆虫，也啄取岛屿、海边的无脊椎动物，有时还见到它们在菜园中觅食。此鸟在我国基本上是冬候鸟，新疆最早见于 8 月；东北 10—11 月间曾见于长