

色，体侧稍暗黄。

幼鸟：头顶趋黄褐；喉部的黑斑不显著。

虹膜褐色；嘴黑色，秋天转褐；脚肉色。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (36)	23	140	11.7	72	60	18.4
	(20—25)	(124—156)	(10.8—12.5)	(68—77)	(50—68)	(17—20.5)
♀♀ (11)	21.8	134.7	11.1	67.7	54.6	17.5
	(17—24)	(128—146)	(10.4—11.6)	(65—73.5)	(52—61)	(16.5—19.5)

Passer montanus dilutus Richmond, 1895, Proc. u. s. Nat. Mus. 18: 575 (模式产地：新疆莎车)。

(3) 青藏亚种 *Passer montanus tibetanus* Stuart Baker

主要分布在青藏高原。见于西藏拉萨、错那、亚东、吉隆、白马、邦达、类乌齐、察雅、同普、聂拉木、定日、浪卡子打龙、珠穆朗玛峰地区的卡达河谷、卡拉，青海玉树、昂欠、曲玛来、称多，四川若尔盖、石渠、色达等。国外见于尼泊尔，锡金，不丹等。

头顶棕栗色，背部棕褐；体形较大有别于其他任何亚种。

量衡度：

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (37)	19.8	148.3	10.9	76.5	64	17.9
	(15—26)	(140—161)	(9.5—11.5)	(72.5—81)	(60.5—69.5)	(17—19.5)
♀♀ (10)	20.6	148.5	11.5	73.5	61	17.9
	(15—26)	(132—160)	(10—12.5)	(70—77.5)	(56—66.5)	(16—18.5)

Passer montanus tibetanus Stuart Baker, 1925, Bull. Brit. Orn. Cl. 45: 92 (模式产地：西藏马冈宗)。

(4) 普通亚种 *Passer montanus saturatus* Stejneger

主要分布在我国东部，从内蒙古东部，经河北，山东至福建，并包括澎湖列岛和台湾省，向西经陕西，甘肃至青海东部（留鸟；在沿海各省有一部分为迁徙鸟）。国外分布于俄罗斯萨哈林岛（库页岛），日本，并经济州岛、对马岛至朝鲜半岛。

形态详见种的描述

Passer saturatus Stejneger, 1885, Proc. U. S. Nat. Mus. 8: 19 (模式产地：硫球群岛)。

Passer montanus kansuensis Stresemann, 1932, Orn. Monatsb. 40 (2): 55 (青海西宁通海)。

(5) 云南亚种 *Passer montanus malaccensis* Dubois

见于云南大部（德钦、丽江地区除外，芒康、左贡、巴塘等，系过渡类型），四川盆