

分布 本属在我国仅有一种，见于东北部，内蒙古和天山，偶尔见于河北。国外见于欧美北部，俄罗斯，日本和朝鲜半岛。

Plectrophenax Stejneger, 1882, Proc. V. S. Nat. Mus. 5: 33. 模式种: *Emberiza nivalis* Linnaeus.

86. 雪鹀 *Plectrophenax nivalis* Linnaeus

英文名: Snow Bunting.

别名: 雪雀 (东北); 路边雀 (吉林)。

地理分布 国内见于黑龙江，吉林，内蒙古 (冬候鸟); 新疆天山和河北 (罕见鸟)。国外为广布种，在欧、亚、北美等地极北地区繁殖。

鉴别特征 冬夏羽色不同，夏羽主为黑白两色，冬羽多呈棕黄色，如烟熏染一般。

形态 (据北方亚种)

雄性成鸟 (冬羽): 中央冠纹从嘴基至枕部栗黄色，头顶有时露出黑色羽基; 耳羽和上胸侧栗黄色; 肩和背的羽缘灰沾黄色; 腰、短的尾上覆羽及下体概白色，有时沾黄; 最长的尾上覆羽黑色，具栗色宽缘; 三对中央尾羽黑色，羽缘灰色，外侧三对尾羽白色，羽端具褐色条纹; 小翼羽黑色，翼覆羽、内侧次级飞羽和初级飞羽均黑色，中和大覆羽尖端白色，内侧次级飞羽外缘栗色，所有的覆羽和初级飞羽均外缘以灰色; 前3枚次级飞羽为白色; 下体白色，胸沾棕褐色; 腋羽和翼下覆羽白色，第10枚初级飞羽白色，但羽端具两个棕色点斑。

雄性成鸟 (夏羽): 上体除初级飞羽基部外，内侧次级飞羽、肩羽及尾羽均黑色，上下体余部均白色。(据马国恩12月在兴安岭采的标本)。

雌性成鸟 (冬羽): 上体棕褐色，具黑褐色纵纹，内侧飞羽具宽阔棕黄色羽缘; 下体白色沾棕。

虹膜褐色; 嘴浅褐色，嘴峰黑色，雌鸟嘴黄，尖端黑暗; 腿脚黑色。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂ (6)	35—45	155—185	11—12	102—110	63—75	19—22
♀♀ (5)	32—41	145—180	10—12	100—105	58—70	20—21

亚种分化 本种共4个亚种，在我国仅见一亚种，即:

(1) 北方亚种 *Plectrophenax nivalis vlasowae* Portenko

分布于内蒙古博克图，黑龙江呼玛、兴凯湖、小兴安岭，吉林土门岭、老爷岭、汪清、安图、长春，河北秦皇岛。国外见于俄罗斯乌苏里斯克 (双城子)，日本和朝鲜半岛。

形态详见种的描述。

Plectrophenax nivalis vlasowae Portenko, 1937, Vsesouiznyi Auk, Inst., Problemy Asktihi, 3, p.

124 (模式产地: 俄罗斯)。