

2. 喉黑；胸、上腹及翼下胁羽等均白；下腹黑 白斑军舰鸟 *F. ariel* (112)
 喉黑；胸和腹均白 白腹军舰鸟 *F. andrewsi* (113)

1. [小] 军舰鸟 *Fregata minor* (Gmelin)

别名：小军舰鸟。

英文名：Great Frigate Bird, Eastern Lesser Frigate Bird.

地理分布 广布于印度洋和太平洋等的热带和亚热带海域。在我国获见于广东和福建沿海及西沙群岛，北达江苏的镇江和沙卫山岛，亦偶见于河北的秦皇岛和北戴河，在台湾，据王嘉雄等 (1991)，曾见于宜兰兰阳溪口、台北野柳、台中大肚溪口、南投埔里、台南七股、屏东、台东大武、小琉球、兰屿等。

形态

雄性成鸟：全身黑色而有光泽，喉囊红色。飞行时，翅上有一褐色横带。

雌性成鸟：上体黑色；喉灰白色，胸、上腹及两胁等均白，下腹黑。

量度 (据 La Touche):

性别	嘴峰	翅	尾
♂ (2)	86.5, 89	516, 531	300, 305
♀ (1)	89	562	338

分类讨论 本种有5个亚种，见于我国者为指名亚种。

本种在我国内是此科体形最大的军舰鸟，所以常被称为“Great Frigate Bird”；但在世界上却较拉丁美洲沿海的 *Fregata magnificus* Mathews 稍小些，因而又叫做“Lesser Frigate Bird”。现依据拉丁文原名，译订为“[小] 军舰鸟”。

生态 详见科的性状。食物以飞鱼和乌鲷等为主。繁殖结群在海岛上，常在干燥季节。巢以树枝筑在树上，距地面很近，或高达15m。每产仅1卵。

Pelecanus minor Gmelin, 1789, Syst. Nat. ed. 13, 1: 572 (模式产地：印度洋东部)。

2. 白斑军舰鸟 *Fregata ariel* (G. R. Gray)

英文名：Lesser Frigate Bird, Least Frigate Bird.

地理分布 遍布于印度洋及太平洋西部。在我国台湾，见于台北野柳及石门、高雄西子湾、澎湖乌公 (据王嘉雄等, 1991)；据 Hachisuka 和 Udagawa (1951)，此鸟在西沙群岛繁殖；现查 Delacour 和 Jabouille 发表关于西沙群岛鸟类的原著 (1930)，文中所提的是小军舰鸟而非白斑军舰鸟。

形态

雄性成鸟：上体黑，后颈有一白色横斑；喉囊红色；下体亦黑，两胁各具一个显著白斑。