

隙间产一枚白色的卵。

分布范围广大,见于北极圈以南的海洋中。全世界计有8属20种;国内至今仅纪录得1属2种。

A. 叉尾海燕属 *Oceanodroma* Reichenbach

Oceanodroma Reichenbach, 1853, Avium Syst. Nat. (1852), p. 4. Type, by original designation, *Procellaria furcata* Gmelin.

小型海鸟;体羽大都暗乌褐色;鼻管仅具一孔,开口在嘴峰上;翅长而尖,第2枚初级飞羽最长;尾较翅的一半较长,外侧尾羽较中央尾羽较长,因而或多或少地呈为叉状。

计11种,广泛分布于各海洋中;国内仅有2种,检索如次:

- | | | |
|-------------|-------|-------------------------------------|
| 下腰羽端及尾上覆羽白色 | | 白腰叉尾海燕 <i>Oceanodroma leucorhoa</i> |
| 腰及尾上覆羽均无白色 | | 黑叉尾海燕 <i>O. monorhis</i> |

1. 白腰叉尾海燕 *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot)

别名:白腰海燕(鸟类试编)。

英文名:Fork-tailed Storm Petrel, Leach's Storm Petrel, Fork-tailed Petrel.

地理分布 太平洋北部及大西洋自北而南抵巴西及非洲南端。国内仅偶见于黑龙江下游及江口。

形态 上体乌黑褐色,额、头顶前部、眼先等沾灰;翅上覆羽灰褐,形成一道较淡的横带。下腰的羽端以及尾上覆羽均白,而具褐色羽干。下体较多褐色带灰,尤以颏、喉等部为然。

量度(据 Witherby, 1924, vol. 2, p. 414):

性别	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂ ♂ (12)	15—16.5	150—160	中央一对: 59—67 最外侧一对: 76—90 尾叉深度: 14—25	23—26
♀ ♀ —	—	149—160 (个别164, 165)		

生态 远洋性海鸟,罕飞抵陆地上。结群繁殖于岛上高地的岩石间,有时在草堆中。本种有4个亚种;见于我国北部的,当为指名亚种。

Procellaria leucorhoa Vieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. ed., 25 (1817), p. 422 (模式产地: Picardy, France).

2. 黑叉尾海燕 *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe)

别名:宣厚的海燕(鸟类试编)。