

起飞。

通常在林下落叶层较厚的地面上边刨食边发出叫声。叫声似家养母鸡发出的“咯、咯、咯……”的拉长音。

繁殖在4—7月间,在海拔低的地区较早,海拔高的地区则较迟。巢置于森林下木,垫有草或树叶低洼处,常呈深杯状。每窝产卵3—5枚。卵呈白色,结构平滑精细。

这种山鹧鸪在国内是一种罕见的鸟类,产业意义不大。

Perdix torqueola Valenciennes, 1825, Dict. Sci. Nat. 38: 435 (模式产地: 孟加拉)。

13. 红胸山鹧鸪 *Arborophila mandellii* Hume (图版一: 左图 1)

地理分布 产于我国西藏自治区东南部丹巴江和米许密山一带(留鸟)。在国外,见于锡金、不丹和印度。

鉴别特征 这是一种典型的矮肥的山鹧鸪。背和肩的羽毛不具黑色横斑,不具或仅可稍微见到暗色羽缘。喉部淡橄榄栗色,其下缘具一条黑领清楚地把深栗色胸部隔开。两性体色相同。

形态 眼先、额和头顶前部暗栗色,逐渐转变为头顶后部和后颈上的褐色;眼前部之下具一狭窄的淡黄色条纹;暗灰色眉纹从眼开始向后延伸至后颈而左右相遇;后颈下部和背的极上部淡红栗色,而具黑斑;颈侧棕而杂以黑点;背、腰、尾和尾上覆羽橄榄色,而杂以狭窄的黑色羽缘,除背之外,几乎所有羽毛均具宽阔的中央黑斑;肩和翅上覆羽与背同色,但具较细的黑斑;翼羽褐色;内侧次级飞羽和大覆羽具栗色羽缘,淡灰色块斑及宽阔的黑色端斑。颊、喉等均淡橄榄栗色,后接一个白色块斑与一条黑色领环清楚地与深栗色的上胸隔开;下胸至肛周灰色;两胁具不同程度的栗色,并或多或少地杂以白斑;腹部中央色更淡,有时渲染以灰色;尾下覆羽橄榄色,具白斑和棕色羽端及杂斑。

虹膜褐至红褐色;嘴黑;脚淡红。

量度:

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	243	15(仅前部)	127	38	38(据休姆 Hume)
♀	—	19—20	133—145	56—68	43—45(据贝克)

生态 栖息在1,300—1,800米或更高的山地,尤喜匿栖在稠密的常绿树林中,叫声是一种响亮、沉重而拉长的,紧接着一系列渐升的双音调,直至最高点,与环颈山鹧鸪很相似,但较清晰。繁殖期在3—6月。

是一种极为罕见的鸟类,经济价值不大。

Arborophila mandellii Hume, 1874, Str. Feath. 2.449 (模式产地: 不丹)。

14. 绿脚山鹧鸪 *Arborophila chloropus* (Blyth)

地理分布 分布于我国云南省(留鸟)。在国外分布于缅甸、老挝、泰国。 —