

以黑褐色蠹状细斑,间杂以一、二粗斑,并具白色或浅棕黄色羽干;飞羽大都黑褐;内侧初级飞羽及次级飞羽的外翮与背同色。尾羽黑褐,中央一对尾羽的两翮边缘具暗栗色细斑,两侧3对尾羽的外翮也是如此,但不很显著。耳羽簇栗色。颈和喉白色带棕;胸浓红棕色,羽干棕白;腹和两胁棕色更浅而沾灰,并稍具黑褐色虫蠹状斑,羽干浅棕近白;下腹中央灰白;尾下覆羽淡黑褐色。

虹膜褐色;嘴角褐色,基部较暗。肉冠小,为洋红色;不具肉垂和距等。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(15)	990 (800—1,050)	约633 (537—710)	17.1 (16—19)	223.7 (210—235)	338.8 (300—394)	78.7 (70—82)
♀♀(3)	550—750	416—462	15—16	185—195	140—160	62—68

亚种分化 原鸡计有5个亚种;在国内有2个亚种,现检索如下:

雄鸟颈部矛翎较短,不及100毫米(从后颈基部量起),并呈暗红色;雌鸟后颈羽缘较棕.....

.....**海南亚种 *Gallus gallus jabouillei***

雄鸟颈部矛翎较长,约达130毫米(从后颈基部量起),除羽基呈金红色外,为金橙色,各羽并贯以

明显的褐色羽干纹;雌鸟后颈羽缘较黄.....**滇南亚种 *G. g. spadiceus***

(1) 滇南亚种 *Gallus gallus spadiceus* (Bonnaterre)

分布于云南西部、西南部及南部的西双版纳(留鸟)。在国外,产于缅甸、泰国、老挝北部、马来半岛及印度尼西亚的苏门答腊岛北部。

形态详见上文。

Coturnix spadiceus Bonnaterre, 1791. Tabl. Encycl. Neth. 1: 218 (模式产地: 马来半岛)。

(2) 海南亚种 *Gallus gallus jabouillei* Delacour et Kinnear

终年留居云南东南部,广西西南隅及广东的海南岛;在国外,分布于越南北方。广东海南岛所产的原鸡,竟然与越南北方所产的,同属于一个亚种。

雄性成鸟: 体形较滇南亚种稍小;颈部矛翎较短,最长的从后颈基部量起,不及100毫米,各羽主要为暗红色,羽端橙黄色较少,褐色羽干纹不显。

雌鸟成鸟: 体形也较滇南亚种小些;后颈和上背的羽缘较棕,上体余部较多锈红色;上胸红棕;下胸以下转棕灰色。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(10)	844 (672—1,020)	约592 (484—690)	16.5 (15.5—17.9)	216 (207—223)	207 (167—340)	73 (69—77.2)
♀(1)	500	约432	16.5	192	151	63.5

Gallus gallus jabouillei Delacour et Kinnear, 1928, Bull. Brit. Orn. Cl. 49: 49 (模式产地: 越南北方东北)。

生态 原鸡是热带林区的鸟类,分布于低海拔和中海拔,直至约二千米高的地带。适应力强,遍见于板栗林和次生竹、阔叶混交林中,也见于稀疏林或灌木林中。凡是有植被