

形态详见上文。

*Ithaginis sinensis* David, 1873, Ann. Sci. Nat., Zool. (5) 18, art. 5: 1 (模式产地: 陕西秦岭)。

*Ithaginis sinensis sinensis*, Hartert, 1921—22, p. 1948.

(5) 指名亚种 *Ithaginis cruentus cruentus* (Hardwicke) (图版一: 右图 2; 图版二: 图 1)

分布于西藏南部春丕山谷及中尼边界的珠穆朗玛峰地区; 在国外, 见于尼泊尔、锡金及不丹西部。

雄性成鸟: 与秦岭亚种相较, 喉暗红, 前颈黑, 羽端黄白; 上胸皮黄, 或多或少地杂以红色斑; 下胸和两胁浅绿; 额和头顶前部黑; 头顶后部黄白, 羽冠深灰而具宽阔白色轴; 眉纹黑; 耳羽黑而具灰白色纵纹; 上体较灰而少褐色, 白色轴纹较狭, 尤其是在背部; 两翅表面与背同色, 各羽具宽阔的白色沾绿的轴纹; 上体和两翅上白纹的两侧均各具一较狭的黑线; 大覆羽及三级飞羽的羽片均灰色; 尾褐, 羽端转白, 羽亦绯红, 如秦岭亚种一样。

雌性成鸟: 额、脸、耳羽及喉等均肉桂色; 羽冠及项均灰; 上体褐, 杂以黑褐色细点, 在两翅及尾上较粗; 下体棕褐, 腹和两胁稍具细点。

*Phasianus cruentus* Hardwicke, 1821, Trans. Linn. Soc. London 13 (1): 237 (模式产地: 尼泊尔)。

(6) 西藏亚种 *Ithaginis cruentus tibetanus* Baker (图版一: 右图 1)

分布于我国西藏达旺与不丹东部相邻的山地(留鸟)。

雄性成鸟: 与指名亚种区别在于额、脸以及眼上和眼下的羽毛都是红而非黑的; 胸部羽毛也较多红色; 羽冠较灰; 耳羽后部呈灰和白色; 尾羽灰白。

雌性成鸟: 似指名亚种, 但较暗些, 下体较明显地杂以细斑。与增口亚种区别无多, 但羽色稍较棕些, 下体的轴纹较明显些。

量度与指名亚种相近似。

*Ithaginis tibetanus* Baker, 1914, Bull. Brit. Orn. Cl. 35: 18 (模式产地: 我国西藏达旺与不丹交界的山脉)。

(7) 增口亚种 *Ithaginis cruentus kuseri* Beebe (图版一: 右图 3)

分布于西藏东南部及云南西北部(留鸟)。

雄性成鸟: 额、喉及胸几乎纯深红色; 眉纹、耳羽及头和颈的两侧全黑; 喉和胸的红色间也有一道宽阔的黑带。

雌性成鸟: 与西藏亚种相似, 但较暗褐。

量度:

性 别	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(2)	22—22.5	208—215	188—196	65—66
♀♀(2)	20—22	192—201	162—164	59—63

*Ithaginis kuseri* Beebe, 1912, Zoologica 1: 190 (模式产地: 云南西北部德钦)。

(8) 滇西亚种 *Ithaginis cruentus marionae* Mayr

分布于云南西部龙川江与怒江间的山脉(留鸟)。