

- 上背各羽有 4—5 道黑纹;肩羽具 2—3、3 或 3—4 道黑纹;尾较短;中央尾羽的外翮基部大都具斜行黑纹..... 5
4. 肩羽黑纹较粗,最粗的达 2—3 毫米;后颈微具细纹;背羽黑纹稍粗,并在羽端处较呈折断的波状;尾长一般在 750 毫米以上;中央尾羽纯白;外侧 3 对尾羽几乎全黑..... **峨眉亚种** *L. n. omeiensis*
- 肩羽黑纹较细,一般不及 1 毫米;后颈一般纯白;背羽黑纹稍细,并较完整;尾长一般在 730 毫米以下(个别例外);中央尾羽的外翮基部具斜行黑纹,有时全部纯白;外侧尾羽白而具黑纹..... **福建亚种** *L. n. fokiensis*
5. 上背黑纹较细;肩羽有 2—3 道黑纹,在外 2 道较粗;后颈纯白;尾长 2♂♂ 581—665 毫米;中央尾羽末端 1/2 纯白..... **指名亚种** *L. n. nycthemera*
- 上背黑纹较细;肩羽有 3 道细黑纹;后颈纯白;尾长 9♂♂ 570—670 毫米;中央尾末端 1/3 纯白..... **滇南亚种** *L. n. beaulieui*
- 上背黑纹较粗;肩羽有 3 道细黑纹;后颈常具黑点;中央尾羽末端 1/3—1/4 纯白..... **掸邦亚种** *L. n. jonesi*
- 背面似掸邦亚种,但较密迩,而波状亦更著;肩羽有 3—4 道较粗的黑纹;后颈纯白;尾较掸邦亚种为长(582—656)毫米;中央尾羽末端 1/4 纯白..... **滇西亚种** *L. n. occidentalis*

**(1) 滇西亚种 *Lophura nycthemera occidentalis* Delacour**

留居云南西部腾冲、潞西一带;在国外见于缅甸东北部。

雄性成鸟:背白,各羽有 4—5 道黑纹,酷似掸邦亚种,但较密,而波状亦更著;肩羽有 3—4 道较粗的黑纹;后颈纯白;尾较掸邦亚种稍长些(582—656)毫米;中央尾羽末端 1/4 纯白。

量衡度:

性别	体重	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂(5)	1,425—1,725	920—1,040	34—36	254—278	532—656	91—99
♀(1)	1,150	约707	33.5	269	320	—

*Lophura nycthemera occidentalis* Delacour, 1948, Amer. Mus. Novit. 1377: 7 (模式产地:云南腾冲)。

**(2) 缅北亚种 *Lophura nycthemera rufipes* (Oates)**

留居我国云南西南隅怒江流域及缅甸掸邦北部。

雄性成鸟:背黑而具白纹,与国内白鹇的其他亚种显然有别。尾长在 500 毫米以下,也和其他各亚种不同。

量衡度(据德拉科,1951):

性别	全长	嘴峰	翅	尾	跗蹠
♂♂	1000	32	260—285	400—480	90
♀♀	—	—	240—257	250—275	—

*Gennaues rufipes* Oates, 1898, Man. Game Bds. Ind. 1: 362 (模式产地:缅甸东北部)。

**(3) 掸邦亚种 *Lophura nycthemera jonesi* (Oates)**

留居云南西南部,介于怒江和澜沧江之间,东至景东一带;在国外,分布于缅甸掸邦南部及泰国北部和中部。

雄性成鸟:背白,各羽具 4—5 道黑纹,这些黑纹较指名亚种为粗;肩羽有 3 道细黑