

表 7 黑琴鸡亚种特征的比较

亚 种	新 疆 亚 种 <i>L. t. mongolicus</i>			北 方 亚 种 <i>L. t. baikalensis</i>		东 北 亚 种 <i>L. t. ussuriensis</i>	
	性 别	♂	♀	♂	♀	♂	♀
翅 长	据我们的标本	259	—	263—283	232—237	265	237
	据斯特格曼 (Stegmann, 1932)	(20)277 273—296	(20)250 242—263	(25)282 276—291	(21)252 245—257	266—283	232—256
羽 色	♂体羽的黑褐色较暗,与指名亚种相似,头、颈、下背及腰等部羽色深蓝带绛红色光泽			♂体羽与东北亚种相似,但头、颈、腰及下背部羽毛的金属光泽更亮而带绿		♂体羽亦为黑褐色、但略带棕,头、颈、下背及腰部羽色深蓝带绿金属光泽	

(1) 新疆亚种 *Lyrurus tetrrix mongolicus* Lönngberg

分布于新疆西部塔城、喀什及北部阿勒泰(留鸟);在国外见于苏联阿尔泰地区及蒙古西北部。

雄鸟羽色较暗,体形较小,详见表 5。

量度:

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	580	30	259	192	49

Tetrao tetrrix mongolicus Lönngberg, 1904, Orn. Monatsb. 12: 108 (模式产地: Baimgol and Chantengrei, 天山山脉)。

(2) 北方亚种 *Lyrurus tetrrix baikalensis* (Lorenz)

分布于东北大兴安岭根河、大黑河、呼伦贝尔、伊图里河等地(留鸟)。国外分布在贝加尔及蒙古北部。

全身羽色较淡,体羽的辉亮部分深蓝偏绿,体形较大。

量度: 见上面种的形态。

Tetrao tetrrix var. *baikalensis* Lorenz, 1911, in Lorenz, Birkhuhner Russl.: 3 (模式产地: 外贝加尔)。

(3) 东北亚种 *Lyrurus tetrrix ussuriensis* (Kohts)

分布于我国的小兴安岭及苏联乌苏里边区。

形态见表 7。

量度:

性 别	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	31	265	189	48
♀(1)	25	237	130	49

Tetrao tetrrix var. *ussuriensis* Kohts, 1911, in Lorenz, Birkhuhner Russl. 3 (模式产地: 乌苏里江流域)。