

(2) 莎车亚种 *Phasianus colchicus shawii* Elliot

分布于新疆南部和田、西部莎车和喀什,东抵塔里木河上游(留鸟)。

上体大都橙红色;无白色颈圈,或仅有遗迹;翅上覆羽白,而具栗红色羽缘;胸大都暗绿,中部带铜红色,各羽的羽端绿黑色;两胁金橙色,羽端点黑。

Phasianus shawii Elliot, 1870, Proc. Zool. Soc. London: 403 (模式产地: 新疆莎车)。

(3) 塔里木亚种 *Phasianus colchicus tarimensis* Pleske

分布于新疆东南部,南自车尔臣河,北至博斯腾湖一带(留鸟)。

头顶青铜绿色,无白色眉纹和颈圈;上背淡金橙色,各羽端缘中央的缺刻具一小黑斑;下背和腰等橄榄黄色,杂以绿色和栗色斑;翅上小覆羽淡灰,大覆羽淡沙褐色而具栗色斑;胸的极上部和极下部暗绿,其余部分为紫铜红色;两胁棕黄,而具黑色点斑。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂(1)	1,031	820	38	240	465	65

Phasianus tarimensis Pleske, 1888, Proc. Zool. Soc. London: 415. (模式产地: 新疆车尔臣河至罗布泊)。

(4) 南山亚种 *Phasianus colchicus satscheuensis* Pleske

分布于甘肃西北部,南山山脉以北,位于疏勒河流域,在酒泉与敦煌附近的哈拉湖之间(留鸟)。

上体羽色显著浅淡;头顶淡绿,稍见有白色眉纹;白色颈圈狭,而在前颈处有中断;背部淡金黄;胸部铜橙,而具狭形黑色羽缘;两胁金黄;翅长 237—251 毫米(据德拉科, 1951)。

Phasianus satscheuensis Pleske, 1892, Bull. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb. 3: 136 (模式产地: 甘肃祁连山山脉北部)。

(5) 青海亚种 *Phasianus colchicus vlangalii* Przevalski

分布于青海柴达木盆地东部,在布尔汗布达山和托来河间(留鸟)。

头顶暗铜绿,无眉纹;白色颈圈亦缺,或仅有遗迹;背淡棕黄,羽端点黑;胸大都暗绿,两胁金棕,羽端黑而成横斑状。

量度:

性 别	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 蹠
♂♂(2)	785—830	36(仅 1 ♂)	236—350	485—490	63—65

Phasianus vlangalii Пржевальский, 1876, Монг. и Ст. Тангут: 115 (模式产地: 青海柴达木盆地)。

(6) 甘肃亚种 *Phasianus colchicus strauchi* Przevalski

分布于青海东北部,甘肃西北和西南部,东抵陕西南部秦岭山脉,南至四川北部若尔盖及东北部万源一带(留鸟)。

头顶铜绿,无眉纹;白色颈圈亦缺,有时却存在;背浅栗色,黑斑粗著;上胸(有时仅胸的极上部)暗绿,下胸铜红,而具狭细的黑色羽缘;两胁浅金棕或栗色,羽端具黑色横斑。