

性 别	嘴 峰	翅	尾
♂(1)	28.5	235	—

Pucrasia meyeri Madarász, 1886, Ibis: 145 (模式产地: 西藏东南部)。

(2) 陕西亚种 *Pucrasia macrolopha ruficollis* David et Oustalet

分布于甘肃南部, 陕西南部及四川北部(留鸟)。

雄性成鸟: 本亚种与河北亚种和东南亚种等相似, 尾下覆羽均具深栗色, 与不具栗色尾下覆羽的安徽亚种显然有别。在上述的3个亚种中, 东南亚种的背羽具4条黑色纵纹, 又与本亚种和河北亚种之具2条黑纹截然不同。

本亚种与河北亚种极相似, 但颈部领斑较后者之皮黄色为深, 而呈橙棕色; 头顶前部呈金属黑色, 后部暗棕褐, 而在河北亚种则头顶几乎全为褐棕色; 颈侧白斑较小, 不及20×20毫米(河北亚种的颈侧白斑约达20×30毫米); 背羽的纵带较宽, 较纯黑, 而不沾栗, 纵带间虫蠹状细纹较不显著, 灰色较纯而不沾紫; 下体中央的带斑, 栗色较暗浓。

量衡度:

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂♂(2)	1,000—1,281	约570	27—30	220—228	200	62—64
<i>Pucrasia xanthospila</i> var. <i>ruficollis</i> David et Oustalet. 1877, Ois. Chine: 408 (模式产地: 陕西)。						

(3) 河北亚种 *Pucrasia macrolopha xanthospila* G. R. Gray(图版五: 图2)

分布于山西北部, 河北北部, 东北辽宁西南隅(留鸟)。

形态详见前文。

Pucrasia xanthospila G. R. Gray, 1864, Proc. Zool. Soc. London: 258, pl. 309 (模式产地: 北京西北山地)。

(4) 安徽亚种 *Pucrasia macrolopha jorettiana* Heude

分布于安徽西部(留鸟)。

雄性成鸟: 与河北亚种相比, 颈部无黄色领斑; 冠羽较多而密集, 长度不超过55毫米(河北亚种的羽冠长达75毫米); 背、胁及两翅上的灰色部分较淡而近白; 中央尾羽无栗色; 尾下覆羽也同样, 或仅于黑色部分边缘处的左右, 各具一栗色点斑。

雌性成鸟: 与河北亚种没有什么差别。尾下覆羽微具或无栗色; 外侧尾羽浅灰色, 具黑色次端斑及白色端斑, 灰色部分的黑色横斑不完整或完全消失。

量衡度:

性 别	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂♂(9)	25.4 (22—28.5)	221.7 (215—230)	215 (195—224)	64.3 (62—68)
♀ ♀(5)	25—26	198—202	163—174	56—60

Pucrasia jorettiana Heude, 1883, Ibis (5) 1:225 (模式产地: 安徽霍山)。

(5) 东南亚种 *Pucrasia macrolopha darwini* Swinhoe

分布四川东部, 湖北西部宜昌一带, 安徽南部, 浙江, 福建西北部, 广东北部(留鸟)。

雄性成鸟: 颈部无黄色领斑, 似安徽亚种, 但背羽灰褐, 而具4条黑色纵带, 成双“V”