

并除小覆羽外，均具白色羽端；初级飞羽暗褐，第3—7枚的外翈（xia，狭；即羽片），部分地缘以白色；尾上覆羽黑褐，端部亦缀以白色细斑，羽端白色斑很宽，约4—5厘米，一系列白斑前后相连成一片白色（我们标本的此部羽毛破损不全）；腹部黑褐、微具白点，羽端闪绿；下胁及肛周羽均具白端；尾下覆羽黑，而具宽达2—2.5厘米的白色羽端；尾纯黑褐色；覆腿羽烟褐色稍具白色。

雌性成鸟：上体自额至腰概棕色，而具宽阔的黑褐闪蓝的横斑，羽端满缀以黑褐色虫蠹状斑；黑褐色斑在头顶常成圆点状，在下背以后部分非常显著，斑的上下缘以棕色狭条；尾上覆羽与尾羽均黑褐色，而杂以不规则的棕红色狭斑，羽端雪白，尾上覆羽的白端特别明显，前后连成一片白色。肩羽及内侧覆羽、飞羽等黑褐与棕色相杂，而棕色部亦密缀以黑褐色虫蠹纹，羽端白色，初级飞羽暗灰褐，第3—6枚的外翈狭缘以污白色或浅棕黄；次级飞羽黑褐，外翈边缘密杂以棕色点，羽端亦白。头侧棕而具黑点，喉浅棕亦具黑点，羽端缀白；上胸黑而有绿蓝色反光，杂以棕色横斑及白色羽端；下胸、腹及两胁亦然，但黑色无金属反光，而白端亦较显著，至肛周几为白色；两胁的棕色部分满缀以黑褐色细纹；尾下覆羽黑，而具狭形棕斑及明显的白端；覆腿羽烟灰色，杂有黑褐色形细而紧密的横斑。

虹膜肉桂色；嘴黑褐；腿上裸皮淡黄白色；脚和趾黑色。

量衡度：

性 别	体 重	全 长	嘴 峰	翅	尾	跗 跖
♂	2,600	910	47	374	315	74
♀	2,050	—	35	315	235	63

亚种分化 本种有2个亚种；在国内仅一亚种，即指名亚种。

(1) 指名亚种 *Tetrao parvirostris parvirostris* Bonaparte

分布于东北北部大兴安岭额尔左纳旗、喜桂图旗及小兴安岭北部，冬时偶见于河北兴隆县。

形态见前文。

Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856, Compt. rend. Acad. Sci. Paris 12: 880(模式产地：斯塔诺夫山)。

生态 松鸡是针叶林鸟类，主要栖息于林下有小松树或沟塘子的落叶松林、红松林和冷杉林中，在偏僻而稠密的桦树林及混交林中亦常见到。冬季喜栖于阳光充足、比较暖和的落叶松林中，大兴安岭冬季晚间气温在-40℃以下，松鸡藏在雪穴中过宿。除春季发情外，均营集群生活。

松鸡几乎整年食松、杉及桦树的叶和枝芽。冬季主要食落叶松的球果、芽蕾及嫩枝；夏季食浆果如越橘（*Vaccinium vitis-idaea*）、笃斯（*V. uliginosum*）、刺玫蔷薇（*Rosa davurica*）等和各种草籽。

巢筑在树根下草丛、倒木下或枯枝堆中，有时也筑在砍伐后的树墩上。巢筑在地上时，为一浅洼，内铺以针叶、枯枝、干草及羽毛等。

5月初产卵。一窝6—10枚卵。卵呈淡灰以至淡褐灰色，散布有黄褐色及赤褐色斑